

## Ujede pod Kraškim robom junija 2011

Podatke zbral: Dejan Bordjan

Opazovali in beležili: vsi udeleženci tabora

### UVOD


Na območju je bilo za Atlas gnezdil Slovenije (1995) zabeleženih šest vrst ujed in sicer skobec *Accipiter nisus*, kragulj *A. gentilis*, kanja *Buteo buteo*, planinski orel *Aquila chrysaetos*, postovka *Falco tinnunculus* ter škrjančar *Falco subbuteo*. Glede na razširjenost po ostalih delih Slovenije oziroma po recentnejših ugotovitvah so na območju prisotni še sršenar *Pernis apivorus*, kačar *Circaetus gallicus* in sokol selec *Falco peregrinus*.

### METODE

Ujede smo beležili v predhodno pripravljen obrazec, ki je vključeval kategorije: vrsta, spol, starost ter smer leta. Zbrane podatke smo vrisali v zemljevid s pomočjo programa ArcView. Podatke smo zbirali vse dni tabora med 26.6. in 2.7.2011. Beležili smo vse vrste ujed razen kanj in postovk, ki sta najpogostejši ujadi v Sloveniji in sta zelo razširjeni. Način opazovanja med posameznimi skupinami ni bil poenoten in je bil odvisen od dela posamezne skupine.

### REZULTATI IN RAZPRAVA

V sedmih popisnih dneh so štiri skupine zabeležile pet vrst: sršenarja, kačarja, skobca, planinskega orla in sokola selca. Opazovali smo sicer tudi kanjo in postovko, vendar si ju nismo posebej beležili. Pričakovano ter tudi dejansko največkrat zabeležena vrsta je bil sršenar, ki smo ga zabeležili 18 krat, skupaj 22 osebkov. Vrsta je glede na opazovanja najpogostejša izmed beleženih vrst. Atlas gnezdil Slovenije ga kot gnezdilke sveta pod Kraškim robom ne omenja. Ocenjujemo, da na območju gnezdi vsaj 14 parov te vrste. S štirimi podatki sledita kačar in skobec. Pri slednjem je glede na delež pokritosti območja z gozdom pričakovati, da na območju gnezdi vek kot najdeni štirje pari. Manjše število opazovanj je verjetno tudi posledica dejstva, da vrsta gnezdi v gozdovih in med gnezdilno sezono redkeje lovi na odprtem. Kačarja smo zabeležili na dveh ločenih območjih. Na območju Treh očk in Leskovca smo trikrat zabeležili odrasel osebek, ločeno pa je bil opazovan še na Srednjem krasu. Status kačarja je v Sloveniji nejasen, vendar prisotnost odraslih osebkov namiguje na gnezdenje na območju med Rakitovcem in Movražem. Sokol selec je bil zabeležen na treh ločenih območjih. Na območju pri Črnem kalu sta bila opazovana mladostna osebkva, ki sta bila verjetno speljana v bližnjih stenah (Črni kal, Mišja peč ali Osp). Opazovani osebek v Škocjanskem zatoku je verjetno le prehranski gost in ne gnezdi v bližini. Planinski orel je bil zabeležen trikrat, vendar gre verjetno za opazovanje para, ki gnezdi v okolici Rakitovca. Tri opazovanja vrste v treh zaporednih dnevih, priča o velikem pomenu travšč na območju Treh očk. Malo preseneča odsotnost kragulja in škrjančarja, ki sta bila zabeležena pri popisih za atlas gnezdil Slovenije (1995).



Slika 1. Razširjenost opazovanj petih zabeleženih vrst ujed na območju pod Kraškimi robom.