



Popis ptic Goričkega - poročilo -

DOPPS, julij 2014

pripravila: Katarina Denac in Primož Kmecl



Naložba v vašo prihodnost

Operacijo delno financira Evropska unija
Evropski sklad za regionalni razvoj



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

Vsebina

UVOD	4
METODOLOGIJA POPISA PTIC	5
Transektni popis ptic	5
Popis velikega skovika s predvajanjem posnetka oglašanja	8
REZULTATI	10
Grbec <i>Cygnus olor</i>	17
Siva gos <i>Anser anser</i>	18
Mlakarica <i>Anas platyrhynchos</i>	19
Reglja <i>Anas querquedula</i>	20
Prepelica <i>Coturnix coturnix</i>	21
Kosec <i>Crex crex</i>	22
Fazan <i>Phasianus colchicus</i>	23
Mali ponirek <i>Tachybaptus ruficollis</i>	24
Čopasti ponirek <i>Podiceps cristatus</i>	25
Čapljica <i>Ixobrychus minutus</i>	26
Kvakač <i>Nycticorax nycticorax</i>	27
Siva čaplja <i>Ardea cinerea</i>	28
Bela štoklja <i>Ciconia ciconia</i>	29
Črna štoklja <i>Ciconia nigra</i>	30
Belorepec <i>Haliaeetus albicilla</i>	31
Kanja <i>Buteo buteo</i>	32
Sršenar <i>Pernis apivorus</i>	33
Skobec <i>Accipiter nisus</i>	35
Kragulj <i>Accipiter gentilis</i>	36
Postovka <i>Falco tinnunculus</i>	37
Škrjančar <i>Falco subbuteo</i>	38
Mokož <i>Rallus aquaticus</i>	39
Grahasta tukalica <i>Porzana porzana</i>	40
Mala tukalica <i>Porzana parva</i>	41
Zelenonoga tukalica <i>Gallinula chloropus</i>	42
Liska <i>Fulica atra</i>	43
Priba <i>Vanellus vanellus</i>	44
Mali martinec <i>Actitis hypoleucos</i>	45
Rdečenogi martinec <i>Tringa totanus</i>	46
Domači golob <i>Columba livia</i> (domest.)	47
Duplar <i>Columba oenas</i>	48
Grivar <i>Columba palumbus</i>	49
Turška grlica <i>Streptopelia decaocto</i>	50
Divja grlica <i>Streptopelia turtur</i>	51
Kukavica <i>Cuculus canorus</i>	52
Velika uharica <i>Bubo bubo</i>	53
Mala uharica <i>Asio otus</i>	54
Lesna sova <i>Strix aluco</i>	55
Pegasta sova <i>Tyto alba</i>	56
Čuk <i>Athene noctua</i>	58

Veliki skovik <i>Otus scops</i>	59
Podhujka <i>Caprimulgus europaeus</i>	61
Hudournik <i>Apus apus</i>	62
Smrdokavra <i>Upupa epops</i>	63
Vodomec <i>Alcedo atthis</i>	64
Zlatovranka <i>Coracias garrulus</i>	65
Črna žolna <i>Dryocopus martius</i>	67
Zelena žolna <i>Picus viridis</i>	68
Pivka <i>Picus canus</i>	69
Veliki detel <i>Dendrocopos major</i>	70
Srednji detel <i>Dendrocopos medius</i>	71
Mali detel <i>Dendrocopos minor</i>	72
Vijeglavka <i>Jynx torquilla</i>	73
Poljski škrjanec <i>Alauda arvensis</i>	75
Čopasti škrjanec <i>Galerida cristata</i>	76
Hribski škrjanec <i>Lullula arborea</i>	77
Kmečka lastovka <i>Hirundo rustica</i>	78
Mestna lastovka <i>Delichon urbicum</i>	79
Drevesna cipa <i>Anthus trivialis</i>	80
Bela pastirica <i>Motacilla alba</i>	81
Rumena pastirica <i>Motacilla flava</i>	82
Siva pastirica <i>Motacilla cinerea</i>	83
Taščica <i>Erithacus rubecula</i>	84
Slavec <i>Luscinia megarhynchos</i>	85
Pogorelček <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	86
Šmarnica <i>Phoenicurus ochruros</i>	87
Repaljščica <i>Saxicola rubetra</i>	88
Prosnik <i>Saxicola torquatus</i>	90
Cikovt <i>Turdus philomelos</i>	91
Carar <i>Turdus viscivorus</i>	92
Kos <i>Turdus merula</i>	93
Pisana penica <i>Sylvia nisoria</i>	94
Črnoglavka <i>Sylvia atricapilla</i>	95
Rjava penica <i>Sylvia communis</i>	96
Mlinarček <i>Sylvia curruca</i>	97
Bičja trstnica <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	98
Kobiličar <i>Locustella naevia</i>	99
Rečni cvrčalec <i>Locustella fluviatilis</i>	100
Trstni cvrčalec <i>Locustella luscinioides</i>	101
Srpična trstnica <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	102
Močvirska trstnica <i>Acrocephalus palustris</i>	103
Rakar <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	104
Grmovščica <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	105
Vrbji kovaček <i>Phylloscopus collybita</i>	106
Rumenoglavi kraljiček <i>Regulus regulus</i>	107
Rdečeglavi kraljiček <i>Regulus ignicapilla</i>	108
Stržek <i>Troglodytes troglodytes</i>	109

Sivi muhar <i>Muscicapa striata</i>	110
Belovrati muhar <i>Ficedula albicollis</i>	111
Velika sinica <i>Parus major</i>	112
Menišček <i>Periparus ater</i>	113
Plavček <i>Cyanistes caeruleus</i>	114
Čopasta sinica <i>Lophophanes cristatus</i>	115
Močvirska sinica <i>Poecile palustris</i>	116
Dolgorepka <i>Aegithalos caudatus</i>	117
Plašica <i>Remiz pendulinus</i>	118
Brglez <i>Sitta europaea</i>	119
Dolgoprsti plezalček <i>Certhia familiaris</i>	120
Kratkoprsti plezalček <i>Certhia brachydactyla</i>	121
Rjavi srakoper <i>Lanius collurio</i>	123
Sraka <i>Pica pica</i>	124
Šoja <i>Garrulus glandarius</i>	125
Kavka <i>Corvus monedula</i>	126
Črna vrana <i>Corvus corone</i>	127
Siva vrana <i>Corvus cornix</i>	128
Krokar <i>Corvus corax</i>	129
Škorec <i>Sturnus vulgaris</i>	130
Kobilar <i>Oriolus oriolus</i>	131
Domači vrabec <i>Passer domesticus</i>	132
Poljski vrabec <i>Passer montanus</i>	133
Ščinkavec <i>Fringilla coelebs</i>	134
Repnik <i>Carduelis cannabina</i>	135
Lišček <i>Carduelis carduelis</i>	136
Zelenec <i>Carduelis chloris</i>	137
Grilček <i>Serinus serinus</i>	138
Dlesk <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	139
Krivokljun <i>Loxia curvirostra</i>	140
Rumeni strnad <i>Emberiza citrinella</i>	141
Trstni strnad <i>Emberiza schoeniclus</i>	142
Veliki strnad <i>Emberiza calandra</i>	143
VIRI	145

UVOD

Do 90. let prejšnjega stoletja je bilo Goričko ornitološko razmeroma slabo raziskano. Zajeto je bilo v popisih za ornitološki atlas Slovenije (Geister 1995), nato pa je pionirsko delo opravil Borut Štumberger, ki je organiziral tudi prvi popis velikega skovika *Otus scops* v letu 1997 (Štumberger 2000). V letih 1997 in 1998 sta bila na Goričkem organizirana mladinska raziskovalna tabora, pridobljeni podatki pa so bili pomembna podlaga za določitev mednarodno pomembnega območja za ptice (IBA) Goričko (Denac 2000). Izven teh popisov je bila narejena le še študija prehrane pegaste sove *Tyto alba* (Janžekovič & Ficko 2000). Z ustanovitvijo pomurske sekcije DOPPS leta 2009 se je vedenje o pticah Goričkega zelo povečalo. Opravljeni so bili tudi popisi za novi ornitološki atlas gnezdil Slovenije (NOAGS) v obdobju 2003-2010, pri čemer je bila večina terenskega dela opravljena v letu 2003. Popisanih je bilo 35 tetrad (kvadratov 2x2 km), zbrani pa so bili tudi naključni podatki o redkih vrstah. Z letom 2004 so se na Goričkem začeli monitoringi nekaterih vrst v okviru nacionalnega monitoringa območij Natura 2000 za ptice: bele štoklje *Ciconia ciconia*, velikega skovika in hribskega škrljanca *Lullula arborea*, z letom 2007 pa so se začeli popisi ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine - SIPKK (Kmecl & Figelj 2013), ki na Goričkem potekajo na petih dvokilometriških transektih. S temi popisi spremljamo številčnost pogostih, splošno razširjenih vrst ptic. Podatki popisov za SIPKK so bili vneseni v podatkovno bazo NOAGS za prvo leto, ko je bil posamezni transekt popisani.

Popisi za NOAGS niso upoštevali različnega upadanja odkrivnosti vrst z oddaljenostjo od opazovalca in tako smo želeli narediti temeljit pregled ptic Goričkega v enotnem popisu, opravljenem v enem letu ter z upoštevanjem zaznavnosti vrst. Možnost se nam je ponudila s projektom Upkač (OP SI-HU 2007-2013), katerega cilji so predvsem ohranjanje, obnova in trajnostno gospodarjenje z visokodebelnimi sadovnjaki v Krajinskem parku Goričko in Narodnem parku Őrseg na Madžarskem. Leta 2012 smo s pomočjo dobro razvite mreže prostovoljcev pomurske sekcije DOPPS v okviru projekta opravili transektni popis na 59 dvokilometriških transektih, ki so enakomerno pokrili celoten park. Rezultati popisa so predstavljeni v tem poročilu.

METODOLOGIJA POPISA PTIC

Transektni popis ptic

Popisna metoda

Gnezdeče ptice smo popisali z metodo standardnega transektnega popisa v dveh pasovih (Bibby *et al.* 1992), dolžina transektja je bila približno 2 km, notranji pas pa je segal 50 m bočno na vsako stran transektja. Popisna enota je bila »par«, približek za registracijo enega para pa so bili posamezen osebek (samec ali samica), ločen od drugih osebkov iste vrste, par, teritorialen samec in gnezdo oziroma speljana družina. Popisna metoda je bila identična metodi popisov za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine (Kmecl & Figelj 2013).

Popis so opravili izkušeni popisovalci v zložni hoji s hitrostjo približno 1,5 km/h. V obeh pasovih, notranjem in zunanem, smo beležili tudi kategorijo »v letu«, v primeru večjih jat, kjer starosti ne moremo opredeliti, pa nismo šteli parov, temveč osebkke (tipični primer je jata škorcev). V analizi podatkov smo upoštevali tudi podatke, ki so bili zabeleženi v letu. Osebkke v jatah smo pretvorili v "pare" z deljenjem z 2, kot to predvideva metodologija NOAGS (Mihelič 2002). Arbitrarno smo iz analize izločili jate s 50 ali več osebkki. Takšna primera sta bila samo dva, in sicer je šlo za škorca v drugem popisu.

Popis smo praviloma opravili do 10. ure zjutraj, večina popisnega dela pa je bila opravljena v okviru dveh popisov: prvi popis 21.4. in 22.4. ter drugi popis 19.5. in 20.5.2012. V nobenem primeru pa prvi popis ni bil narejen kasneje od 26.4. oziroma drugi popis kasneje od 25.5.2012. Kot opremo so popisovalci dobili tudi barvni digitalni ortofoto posnetek z vrisanim transektom in 50 m pasom.


Izbor popisnih ploskev

Najprej smo znotraj meja Krajinskega parka Goričko določili 60 naključnih točk, s pogojem, da morajo biti med seboj oddaljene minimalno 2 km (ta pogoj je onemogočil prekrivanje). Naključne točke smo generirali z dodatkom za ArcView 3.2a - Random Point Generator 1.3 (Jenness 2005).

Okoli teh točk smo naredili pufersko območje (ploskev) s polmerom 1 km. Če je območje segalo čez rob parka za več kot polovico svoje površine, smo ga iz popisa izločili. Od 60 ploskev je bilo treba izločiti eno samo, popis je tako potekal na 59 ploskvah. Znotraj ploskve smo nato poljubno zarisali transekt, z naslednjimi omejitvami:

- približno proporcionalno je bila zastopana krajina znotraj ploskve
- transekt je moral biti znotraj Krajinskega parka Goričko
- transekt je moral biti čimbolj raven (priporočilo je bilo, da koti zavojev niso večji od cca 30°, vendar v praksi to ni bilo izvedljivo)

Kjer je bilo mogoče, so transekti potekali po poljskih in gozdnih poteh. Slika 1 pregledno prikazuje naključne točke, puferske cone in popisne transekte. Skupno smo popisali 124,1 km transektov.



Slika 1: Popisni transekti za popis gnezdilke Goričkega v letu 2012, naključne točke in puferska območja (polmer 1 km) okoli naključnih točk (podlaga: GURS)

Metoda analize rezultatov

V sistematskem delu knjige je vsaka gnezdilka predstavljena s karto razširjenosti in preglednico, ki vsebuje pomembnejše podatke o vrsti. V preglednici 1 je pojasnjen pomen posameznih polj iz sistematskega dela.

Preglednica 1: Pomen vsebine polj v vrstnih preglednicah v sistematskem delu.

Vir podatkov za grafični prikaz:	Navedeni so podatki, na osnovi katerih je bila izrisana karta razširjenosti, ter njihov časovni razpon.
Ocena populacije v KPG:	Kjer je možen izračun relativne gnezditvene gostote iz podatkov popisa leta 2012 (zabeleženih 20 ali več parov), je populacija ocenjena kot zmnožek površine parka (462,68 km ²) in razpona te gostote; populacija je zaokrožena na 10 parov natančno. Pri nekaterih vrstah so bili glede na izkušnje s terena rezultati previsoki in smo jih korigirali. Če ta izračun ni bil možen, smo populacijo ocenili glede na dostopne podatke NOAGS, monitoringa SIPKK, monitoringa SPA in druge lastne podatke.
Zabeležen v:	Podana je frekvenca pojavljanja v popisu leta 2012, in sicer kot število transektov, na katerih je bila vrsta zabeležena.
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	Po Järvinen & Väisänen (1975) in Bibby (1992); razpon je ocenjen s pomočjo empirične standardne deviacije po Järvinen & Väisänen (1983):

	$G = 1000 * N_{SK} * \frac{1 - \sqrt{1 - N_{NP} / N_{SK}}}{P} / D$ $SD = \sqrt{G / R}$ G – relativna gnezditvena gostota v parih / km² N_{SK} – skupno število registriranih parov v vseh transektih N_{NP} – število parov, registriranih v notranjem pasu vseh transektov D – skupna dolžina vseh transektov v km P – polovična širina notranjega pasu, od sredine do zunanega roba, v metrih (v našem primeru 50 m) R – število transektov Razpon je prikazan kot G ± SD.
Ocena populacije v Sloveniji:	Povzeta je ocena populacije iz zadnjega poročila po Direktivi o pticah za obdobje 2008-2013, izdelana leta 2014 (DOPPS <i>lastni podatki</i>).
% nacionalne populacije v KPG:	Izračunan kot odstotek povprečne velikosti populacije na Goričkem v povprečni oceni (aritmetično povprečje) velikosti populacije v Sloveniji.
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	Vrsta sodi med 29 indikatorskih vrst slovenske kmetijske krajine (da/ne) (Kmecl & Figelj 2013)
Status SPEC:	BirdLife International (2004)
Rdeči seznam:	Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam. Priloga 4: Rdeči seznam ptičev gnezdilcev (Aves). Ur.l. RS, št. 82/2002.
Rdeči seznam (osnutek):	Jančar, T. (2011): Rdeči seznam ogroženih ptic gnezdilic Slovenije - osnutek 2011. Priloga 4. V: Denac, K., T. Mihelič, L. Božič, P. Kmecl, T. Jančar, J. Figelj & B. Rubinič (2011): Strokovni predlog za revizijo posebnih območij varstva (SPA) z uporabo najnovejših kriterijev za določitev mednarodno pomembnih območij za ptice (IBA). Končno poročilo (dopolnjena verzija). Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor. DOPPS, Ljubljana.
Dodatek Direktive o pticah:	Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (kodificirana različica). Uradni list Evropske unije, dne 26.1.2010; naveden je dodatek, če je vrsta na njem. Če je vrsta kvalifikacijska za Natura 2000 Goričko, je to označeno.
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	Sešteti maksimumi 35 tetrad NOAGS; rezultat je nato ponderiran s faktorjem 59/35 in zaokrožen na celo število; večina podatkov je iz leta 2003; ponder je količnik med številom transektov, popisanih v letu 2012, in številom transektov, popisanih v okviru NOAGS.
Št. prešteti parov Goričko 2012:	Sešteti maksimumi 59 transektov popisa leta 2012
Maksimalno parov na transektih 2012:	Najvišje število parov, prešteto na kateremkoli transektu
Povprečno parov na transektih 2012:	Izračun: parov Goričko 2012 / 59

Za vrste s (praviloma) 20 ali več zabeleženimi pari (seštevek maksimumov transektov) je razširjenost v parku prikazana s kernelskimi gostotami, ki so bile izračunane s programom ArcGIS 9.3.1. Velikost celice pri izračunu je bila 10 m, polmer iskanja (limit upoštevanja sosednjih podatkov) pa 5000 m. Prikazanih je 13 nivojev gostote, pri čemer največjo gostoto ponazarja najtemnejša barva. Kernelska gostota posamezne podatke razširi (kot če bi npr. privzdignili narobe poveznjeno posodo z mivko) ter jih do določenega polmera sešteje.

Vrste z manj kot 20 zabeleženimi pari ali pa gnezdilke, ki so bile zabeležene v drugih popisih, so predstavljene s posameznimi podatki, vrisanimi na karti, pri čemer so praviloma prikazani naslednji podatki: popis 2012, tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste NOAGS (2001-2014), popis pogostih ptic kmetijske krajine - SIPKK (za prvo leto, ko je bil transekt popisán, so podatki SIPKK vneseni v bazo NOAGS) in literaturni podatki iz revije *Acrocephalus*. Podatki iz baze redkih vrst NOAGS niso bili zbrani sistematično za vse vrste v istem obdobju, temveč gre za naključno zbrane podatke, ki se pri različnih vrstah nanašajo na različna obdobja.

Podlaga za karte razširjenosti je Državna pregledna karta Republike Slovenije v merilu 1: 500.000 (DPK500), 1. izdaja, leto 2008 (© Geodetska uprava Republike Slovenije).

Habitatne zahteve in podatki o prehrani so za nekatere vrste povzeti po Bauer *et al.* (2005).

Za vse transekte smo izračunali tudi Shannonov indeks vrstne diverzitete (Shannon 1948, Odum 1971) in ga predstavili na karti. Indeks smo izračunali za zanesljive gnezdilke (G) po formuli:

$$\bar{H} = -\sum_i \left(\frac{n_i}{N} \right) \log \left(\frac{n_i}{N} \right)$$

H - Shannonov indeks vrstne diverzitete za posamezen transekt


i - i-ta vrsta

n_i - maksimum vseh opaženih parov i-te vrste v dveh popisih

N - skupno število opaženih parov

Popis velikega skovika s predvajanjem posnetka oglašanja

V letu 2012 in 2013 smo na celotnem Goričkem popisali velikega skovika, da bi dobili podatke o njegovi številčnosti in razširjenosti. Popis je potekal s pomočjo predvajanja posnetka samčevega svatovskega oglašanja, monotono ponavljajočega se »tju«. Na vsaki izmed popisnih točk je popisovalec najprej eno minuto poslušal in oprezal za morebitnimi spontano pojočimi samci, nato predvajal eno do dve minuti posnetka in še dve do tri minute čakal na odziv (metoda prirejena po Samwald & Samwald 1992). Vse lokacije dobljenih velikih skovikov smo vnesli na karto in jih kasneje digitalizirali v programu ArcGIS 9.3.1. Popisali smo 429 točk, razporejenih po vsem Goričkem, razen v gozdnatih predelih (slika 2). Popisi so potekali ponoči, začeli pa so se z večernim mrakom (med 21.00 in 21.30) in končali do 2. ure ponoči.




Slika 2: Popisne točke za popis velikega skovika na Goričkem v letih 2012 in 2013 (podlaga: GURS)

REZULTATI

Med popisom v letu 2012 smo zabeležili skupno 99 vrst. Po pregledu literature in drugih podatkov smo ugotovili, da je na Goričkem v obdobju 2001-2014 zanesljivo gnezdilo 111 vrst, 9 vrst pa je bilo možnih gnezdilk. Med popisom v letu 2012 smo zabeležili tudi 10 vrst, ki na Goričkem zagotovo ne gnezdijo. Osem vrst ima v Krajinskem parku Goričko več kot 10 % nacionalne populacije (preglednica 2).

Primerjava Shannonovih indeksov biodiverzitete za transekte, popisane v letu 2012, nam pokaže, da je na Goričkem največja diverzitet gnezdilk v severovzhodnem delu, med Šalovci in Domanjševci. Manjši centri diverzitete gnezdilcev so še nad Rogašovci in zahodno od Kobiljega (slika 3). Zelo podobna slika se pokaže tudi, če uporabimo le podatke indikatorskih vrst kmetijske krajine.



Slika 3: Kernelska gostota Shannonovega indeksa biodiverzitete. Uporabljeni so podatki za vse vrste, ki smo jih registrirali v popisu 2012 in imajo status G – zanesljiva gnezdilka (podlaga: GURS).

Preglednica 2: Seznam vrst ptic Goriškega, ki smo jih zabeležili na popisu 2012, ter gnezdilke iz podatkovne baze NOAGS; podan je njihov status (**Stat**: G – zanesljiva gnezdilka, G? – možna gnezdilka, N – vrsta na Goriškem ne gnezdí, a je bila zabeležena na popisu v letu 2012), ocena populacije v Krajinskem parku Goričko (**PopGor**), frekvenca registracije vrste na 59 transektih popisa v letu 2012 (**F**), relativna gnezditvena gostota (**G**) in njena standardna deviacija (**SD**), število registriranih parov (sešteti maksimumi tetrad) v okviru popisov NOAGS, ponderirano s faktorjem 59/35 (**NOAGS**), število registriranih parov (sešteti maksimumi transektov) v popisu 2012 (**Gor**), indeks med tema vrednostma (**Ind**), odstotek populacije vrste v parku glede na celotno slovensko populacijo (**% SLO**) in obdobje, na katero se nanaša ocena gnezditvene populacije (**Obd**). Z mastnim tiskom so označene tiste zanesljive gnezdilke (G), katerih odstotek nacionalne populacije v Krajinskem parku Goričko znaša 10% ali več.

Slovensko ime	Latinsko ime	Stat	PopGor	F	G	SD	NOAGS	Gor	Ind	% SLO	Obd
grbec	<i>Cygnus olor</i>	G	3 - 3	0			2		0,0	3,3	2003-2014
siva gos	Anser anser	G	1 - 1	0						33,3	2014
mlakarica	<i>Anas platyrhynchos</i>	G	150 - 250	12			30	16	52,7	3,3	2003-2014
reglja	<i>Anas querquedula</i>	G?	0 - 1	0						2,0	2011-2014
prepelica	Coturnix coturnix	G	200 - 250	11			3	21	622,9	15,0	2003-2014
kosec	<i>Crex crex</i>	G	5 - 10	0						2,5	2004-2014
fazan	<i>Phasianus colchicus</i>	G	1000 - 1180	57	2,4	0,2	150	203	135,3	9,9	2012
mali ponirek	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	G	5 - 10	0						1,0	2004-2014
čopasti ponirek	Podiceps cristatus	G	15 - 25	0						13,3	2004-2014
čapljica	<i>Ixobrychus minutus</i>	G	7 - 9	0						8,0	2004-2013
kvakač	<i>Nycticorax nycticorax</i>	G?	0 - 3	0						10,0	2008-2014
siva čaplja	<i>Ardea cinerea</i>	G?	-	3				3			2010-2014
bela štoklja	<i>Ciconia ciconia</i>	G	10 - 12	10				10		5,0	2004-2013
črna štoklja	<i>Ciconia nigra</i>	G	4 - 5	0						9,0	2007-2014
belorepec	<i>Haliaeetus albicilla</i>	G?	1 - 1	0						10,5	2009-2014
črni škarnik	<i>Milvus migrans</i>	N	-	1				1			
rjavi lunj	<i>Circus aeruginosus</i>	N	-	1				1			
močvirski lunj	<i>Circus pygargus</i>	N	-	1				1			
kanja	<i>Buteo buteo</i>	G	300 - 400	43	1,1	0,1	51	62	122,6	5,4	2012
sršenar	<i>Pernis apivorus</i>	G	10 - 20	1			2	1	59,3	3,8	2003-2013
skobec	<i>Accipiter nisus</i>	G	20 - 40	4			13	4	29,7	1,2	2003-2014
kragulj	<i>Accipiter gentilis</i>	G	10 - 20	2				2		2,0	2010-2014

postovka	<i>Falco tinnunculus</i>	G	300 - 400	22			25	25	98,9	15,6	2012
rdečenoga postovka	<i>Falco vespertinus</i>	N	-	1				1			
škrjančar	<i>Falco subbuteo</i>	G	10 - 15	1				1		1,7	2010-2014
mokož	<i>Rallus aquaticus</i>	G	5 - 10	0						5,0	2004-2011
grahasta tukalica	<i>Porzana porzana</i>	G	1 - 3	0						5,0	2012
mala tukalica	<i>Porzana parva</i>	G	2 - 4	0						8,6	2003-2010
zelenonoga tukalica	<i>Gallinula chloropus</i>	G	20 - 30	0			2		0,0	2,9	2003-2014
liska	<i>Fulica atra</i>	G	25 - 40	1				1		8,1	2010-2014
priba	<i>Vanellus vanellus</i>	G	20 - 30	2			3	4	118,6	2,9	2003-2013
mali martinec	<i>Actitis hypoleucos</i>	G	1 - 3	0						0,8	2008-2014
rdečenogi martinec	<i>Tringa totanus</i>	G?	0 - 1	0						3,3	2010
rumenonogi galeb	<i>Larus michahellis</i>	N	-	1				1			
domači golob	<i>Columba livia (domest.)</i>	G	860 - 1030	16	2,1	0,2	81	62	76,6	3,9	2012
duplar	<i>Columba oenas</i>	G	300 - 400	32	1,0	0,1	15	65	428,4	17,5	2012
grivar	<i>Columba palumbus</i>	G	1300 - 1510	56	3,0	0,2	150	193	128,6	5,1	2012
turška grlica	<i>Streptopelia decaocto</i>	G	430 - 560	28	1,1	0,1	54	81	150,2	1,5	2012
divja grlica	<i>Streptopelia turtur</i>	G	200 - 300	31	1,6	0,2	78	79	101,9	5,9	2012
kukavica	<i>Cuculus canorus</i>	G	510 - 640	58	1,2	0,1	98	189	193,3	2,1	2012
velika uharica	<i>Bubo bubo</i>	G	1 - 1	0						1,1	2009-2014
mala uharica	<i>Asio otus</i>	G	50 - 70	0						3,0	2004-2014
lesna sova	<i>Strix aluco</i>	G	200 - 250	1				1		3,2	2004-2014
pegasta sova	<i>Tyto alba</i>	G	1 - 3	0						1,9	2006
čuk	<i>Athene noctua</i>	G	5 - 10	0						6,0	2004-2014
veliki skovik	<i>Otus scops</i>	G	60 - 70	0						8,1	2012-2013
podhujka	<i>Caprimulgus europaeus</i>	G	5 - 10	0						0,2	2012-2014
hudournik	<i>Apus apus</i>	G	10 - 20	2				3		0,4	2010-2013
smrdokavra	<i>Upupa epops</i>	G	20 - 40	5			32	5	15,6	5,0	2012-2013
vodomec	<i>Alcedo atthis</i>	G	7 - 12	0						3,8	2010-2014
zlatovranka	<i>Coracias garrulus</i>	G	0 - 1	0						100,0	2013-2014
črna žolna	<i>Dryocopus martius</i>	G	160 - 230	26	0,4	0,1	22	36	164,3	3,3	2012

zelena žolna	<i>Picus viridis</i>	G	580 - 720	49	1,4	0,2	47	83	175,8	5,4	2012
pivka	<i>Picus canus</i>	G	160 - 200	25			7	33	489,4	4,0	2012
veliki detel	<i>Dendrocopos major</i>	G	3420 - 3750	54	7,8	0,4	79	167	210,8	4,6	2012
srednji detel	<i>Dendrocopos medius</i>	G	30 - 50	2				2		1,5	2010-2014
mali detel	<i>Dendrocopos minor</i>	G	120 - 180	7				8		5,0	2010-2014
vijeglavka	<i>Jynx torquilla</i>	G	160 - 240	31	0,4	0,1	29	48	167,5	2,7	2003-2014
poljski škrjanec	<i>Alauda arvensis</i>	G	500 - 700	19	2,4	0,2	108	66	61,2	4,3	2012
čopasti škrjanec	<i>Galerida cristata</i>	G	30 - 50	3			15	3	19,8	4,8	2003-2014
hribski škrjanec	<i>Lullula arborea</i>	G	40 - 80	11			27	13	48,2	1,6	2010-2013
kmečka lastovka	<i>Hirundo rustica</i>	G	3000 - 5000	48	12,7	0,5	276	259	93,7	1,7	2012
mestna lastovka	<i>Delichon urbicum</i>	G	500 - 700	9	2,0	0,2	32	20	62,4	0,8	2012
travniška cipa	<i>Anthus pratensis</i>	N	-	1				1			
drevesna cipa	<i>Anthus trivialis</i>	G	50 - 100	8				10		0,2	2012
bela pastirica	<i>Motacilla alba</i>	G	1880 - 2130	48	4,3	0,3	59	88	149,2	1,4	2012
rumena pastirica	<i>Motacilla flava</i>	G	5 - 10	1				1		0,2	2011-2014
siva pastirica	<i>Motacilla cinerea</i>	G	15 - 25	3				3		0,3	2009-2014
siva pevka	<i>Prunella modularis</i>	N	-	1			2	1	59,3		
taščica	<i>Erithacus rubecula</i>	G	6380 - 6830	54	14,3	0,5	236	326	138,1	1,0	2012
slavec	<i>Luscinia megarhynchos</i>	G	40 - 70	3			12	3	25,4	0,3	2003-2014
pogorelček	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	G	20 - 40	2			3	3	89,0	0,7	2003-2013
šmarnica	<i>Phoenicurus ochruros</i>	G	2170 - 2430	44	5,0	0,3	101	117	115,7	1,6	2012
repaljščica	<i>Saxicola rubetra</i>	G?	0 - 5	2			5	3	59,3	0,3	2003-2014
prosnik	<i>Saxicola torquatus</i>	G	1350 - 1570	45	3,2	0,2	111	87	78,2	3,2	2012
cikovt	<i>Turdus philomelos</i>	G	3000 - 3320	57	6,8	0,3	147	321	218,9	2,4	2012
carar	<i>Turdus viscivorus</i>	G	640 - 790	37	1,5	0,2	66	64	97,3	1,6	2012
kos	<i>Turdus merula</i>	G	5720 - 6150	59	12,8	0,5	278	360	129,4	1,2	2012
pisana penica	<i>Sylvia nisoria</i>	G	20 - 40	7				14		2,7	2010-2013
črnoglavka	<i>Sylvia atricapilla</i>	G	15760 - 16470	59	34,8	0,8	506	1010	199,7	2,2	2012
rjava penica	<i>Sylvia communis</i>	G	1440 - 1660	35	3,3	0,2	46	72	158,2	5,2	2012

mlinarček	<i>Sylvia curruca</i>	G	20 - 30	6				6		0,3	2010-2014
bičja trstnica	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	G	30 - 50	0			5		0,0	4,2	2003-2014
kobilicar	<i>Locustella naevia</i>	G	10 - 15	0			2		0,0	5,6	2003-2011
rečni cvrčalec	<i>Locustella fluviatilis</i>	G	50 - 70	4			5	13	257,1	3,0	2003-2014
trstni cvrčalec	<i>Locustella luscinioides</i>	G	10 - 15	0			3		0,0	8,3	2003-2014
srpična trstnica	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	G	3 - 5	0						1,6	2010-2014
močvirska trstnica	<i>Acrocephalus palustris</i>	G	800 - 1200	15	4,0	0,3	44	48	109,5	8,0	2012
rakar	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	G	25 - 35	0						10,0	2004-2014
rumeni vrtnik	<i>Hippolais icterina</i>	N	-	4				5			
severni kovaček	<i>Phylloscopus trochilus</i>	N	-	6			3	7	207,6		
grmovščica	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	G?	0 - 5	11				13		0,1	2010-2014
vrnji kovaček	<i>Phylloscopus collybita</i>	G	3070 - 3390	56	7,0	0,3	223	240	107,9	1,8	2012
rumenoglavi kraljiček	<i>Regulus regulus</i>	G	1050 - 1240	11	2,5	0,2	57	24	41,9	0,9	2012
rdečeglavi kraljiček	<i>Regulus ignicapilla</i>	G	150 - 300	4			10	8	79,1	0,2	2003-2012
stržek	<i>Troglodytes troglodytes</i>	G	390 - 580	19			44	26	59,3	0,5	2012
sivi muhar	<i>Muscicapa striata</i>	G	850 - 1020	19	2,0	0,2	19	26	140,2	2,8	2012
belovrati muhar	<i>Ficedula albicollis</i>	G	200 - 400	9			8	20	237,3	2,9	2012
velika sinica	<i>Parus major</i>	G	12680 - 13320	59	28,1	0,7	499	661	132,5	2,2	2012
menišek	<i>Periparus ater</i>	G	340 - 510	16			40	23	56,9	0,1	2012
plavček	<i>Cyanistes caeruleus</i>	G	4760 - 5150	55	10,7	0,4	126	203	160,6	2,2	2012
čopasta sinica	<i>Lophophanes cristatus</i>	G	300 - 400	18			29	29	101,2	0,2	2012
močvirska sinica	<i>Poecile palustris</i>	G	1960 - 2210	36	4,5	0,3	98	72	73,6	1,1	2012
dolgorepka	<i>Aegithalos caudatus</i>	G	590 - 730	21	1,4	0,2	40	32	79,1	2,9	2012
plašica	<i>Remiz pendulinus</i>	G	3 - 5	0			3		0,0	2,0	2014
brglez	<i>Sitta europaea</i>	G	3410 - 3750	50	7,7	0,4	93	140	151,0	2,4	2012
dolgoprsti plezalček	<i>Certhia familiaris</i>	G	300 - 400	17			10	21	207,6	0,5	2012
kratkoprsti plezalček	<i>Certhia brachydactyla</i>	G	400 - 600	13			32	14	43,7	0,7	2003-2012

rjavi srakoper	<i>Lanius collurio</i>	G	500 - 1000	47	7,6	0,4	94	136	144,1	3,0	2012
sraka	<i>Pica pica</i>	G	250 - 350	13			44	22	50,2	2,6	2012
šoja	<i>Garrulus glandarius</i>	G	1770 - 2010	53	4,1	0,3	76	126	166,1	7,6	2012
kavka	<i>Corvus monedula</i>	G	100 - 200	5				12		22,2	2010-2014
poljska vrana	<i>Corvus frugilegus</i>	N	-	2				2			
črna vrana	<i>Corvus corone</i>	G?	0 - 3	1				1		3,8	2010-2014
siva vrana	<i>Corvus cornix</i>	G	1500 - 2000	58	7,1	0,3	184	285	155,1	2,9	2012
krokar	<i>Corvus corax</i>	G	80 - 130	19				23		3,8	2012
škorec	<i>Sturnus vulgaris</i>	G	5000 - 6000	51	24,2	0,6	516	609	118,1	2,1	2012
kobilar	<i>Oriolus oriolus</i>	G	1260 - 1470	58	3,0	0,2	138	217	157,0	4,7	2012
domači vrabec	<i>Passer domesticus</i>	G	4500 - 4890	30	10,2	0,4	187	182	97,3	1,2	2012
poljski vrabec	<i>Passer montanus</i>	G	4500 - 5000	51	20,2	0,6	388	328	84,6	2,0	2012
ščinkavec	<i>Fringilla coelebs</i>	G	9630 - 10180	59	21,4	0,6	811	856	105,6	1,0	2012
repnik	<i>Carduelis cannabina</i>	G	150 - 200	8			25	12	47,5	1,4	2003-2012
lišček	<i>Carduelis carduelis</i>	G	730 - 890	31	1,8	0,2	69	40	57,9	1,2	2012
zelenec	<i>Carduelis chloris</i>	G	3690 - 4040	52	8,4	0,4	190	222	116,5	3,2	2012
grilček	<i>Serinus serinus</i>	G	1180 - 1380	32	2,8	0,2	78	75	96,7	1,4	2012
dlesk	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	G	2000 - 3000	43	9,0	0,4	32	128	399,6	8,3	2012
krivokljun	<i>Loxia curvirostra</i>	G?	0 - 5	1				2		0,0	2012
trstni strnad	<i>Emberiza schoeniclus</i>	G	1 - 3	0						1,3	2010
rumeni strnad	<i>Emberiza citrinella</i>	G	3000 - 5000	56	15,8	0,5	366	399	109,1	3,9	2012
veliki strnad	<i>Emberiza calandra</i>	G	30 - 70	6			19	12	64,7	0,6	2003-2012

Primerjava s kulturno krajino v Sloveniji


Goričko ima še vedno eno izmed najbolj ohranjenih tradicionalnih kulturnih krajin v Sloveniji. To se kaže tudi v populacijah in gostotah ptic, ki so indikatorji te krajine. Nadpovprečne gostote v primerjavi s povprečno slovensko kmetijsko krajino (Kmecl & Figelj 2013) dosegajo na Goričkem duplar, divja grlica *Streptopelia turtur*, zelena žolna, prosnik, rjava penica, rjavi srakoper in rumeni strnad *Emberiza citrinella*. Kljub zaznanim upadom so relativno pogoste tudi nekatere vrste, ki sicer iz slovenske kmetijske krajine izginjajo ali pa so že izginile: hribski škrganec in kavka, ter vrsti, ki smo ju popisovali s posebnimi metodami - veliki skovik in smrdokavra.

Podrobnejši pregled pa prvotni pozitivni vtis precej skazi. Travniške vrste so v primerjavi s popisom za NOAGS doživele precejšen upad populacij. Hribski škrganec, denimo, ima indeks primerjave med tema dvema popisoma 48,2, poljski škrganec pa 61,2. Veliki strnad se na Goričkem z borimi 12 prešteti pari v popisu leta 2012 približuje izumrtju na tem območju. Tudi populaciji smrdokavre in velikega skovika sta v zadnjih 15 letih doživeli drastičen upad. Zgolj izhodiščnim velikim populacijam teh vrst na Goričkem se imamo zahvaliti, da tam še vedno presegajo gostote povprečne slovenske kmetijske krajine.

Upade populacij značilnih travniških vrst ptic pripisujemo obsežnemu in dobro dokumentiranemu spreminjanju travnikov v njive na Goričkem. S tem v zvezi se nam ponuja primerjava s Kozjanskim (Kmecl *et al.* v *pripravi*). Tam je bil upad v obdobju 1999-2010 še bolj drastičen kot na Goričkem. Travniške vrste so tam v tem obdobju upadle za več kot 90%. To obdobje je primerljivo z obdobjem naše raziskave (2003-2012). Na Kozjanskem je sicer zanimivo, da je vzrok upada travniških vrst ptic predvsem intenzifikacija travnikov, saj se njihova površina ni zelo zmanjšala.


Več kot očitno pa na Goričkem deluje še en, prav tako močan dejavnik spremembe krajine. Ob opuščanju tradicionalnih kmetij z mozaično rabo prihaja ponekod tudi do zaraščanja. V pogledu zaraščanja je Goričko podobno Krasu. Ta proces morda pojasnjuje, zakaj smo v popisu 2012 zabeležili pisano penico in drevesno cipo *Anthus trivialis* s 14 oziroma 10 pari, med popisi za NOAGS pa ne. Pozitiven indeks imajo tudi nekatere druge vrste, značilne za zaraščajoče se travnike: rjava penica, rjavi srakoper in rumeni strnad, na zaraščanje pa kaže tudi povečanje populacije rečnega cvrčalca *Locustella fluviatilis*.

Grbec *Cygnus olor*




Vir podatkov za grafični prikaz:	tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste NOAGS (2010-2014), Vrezec (2004a)
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	3 - 3 parov
Vrsta zabeležena v:	0 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	80 - 100 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	3,3
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	O1
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	II/2
Št. prešteti parov v NOAGS (2003-2010):	2
Št. prešteti parov Goričko 2012:	0
Maksimalno parov na transektih 2012:	-
Povprečno parov na transektih 2012:	-
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Grbec je vezan na jezera in mirne reke. Gnezdo si naredi ob robu vode. Par je v času gnezdenja zelo teritorialen in odganja vse vsiljivce. Grbec se hrani z vodnimi rastlinami, občasno pa se pase tudi na kopnem. V Sloveniji njegova populacija narašča. Na Goriškem gnezdijo na Ledavskem jezeru, občasno pa tudi na Hodoškem (Vrezec 2004a).	

Siva gos *Anser anser*




Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2014)
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	1 par
Vrsta zabeležena v:	0 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	2 - 4 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	33,3
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	neovrednotena vrsta – izredna gnezdilka
Dodatek Direktive o pticah:	III/2
Št. prešteti parov v NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	0
Maksimalno parov na transektih 2012:	-
Povprečno parov na transektih 2012:	-
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Siva gos gnezdi na stoječih ali počasi tekočih vodah. Hrani se pretežno z vodnim rastlinjem, na kopnem pa s poganjki, semeni, koreninami in gomolji. V Sloveniji je zelo redka gnezdilka, saj je bilo gnezdenje doslej potrjeno le na petih lokacijah. Ena izmed njih je Ledavsko jezero na Goričkem, kjer je par aprila 2014 vodil mladiče.	

Mlakarica *Anas platyrhynchos*




Vir podatkov za grafični prikaz:	tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste NOAGS (2001-2014), popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	150 - 250 parov
Vrsta zabeležena v:	12 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	3000 - 9000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	3,3
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	II/1, III/1
Št. prešteti parov v NOAGS (2003-2010):	30
Št. prešteti parov Goričko 2012:	16
Maksimalno parov na transektih 2012:	3
Povprečno parov na transektih 2012:	0,27
Indeks popis 2012 / NOAGS:	52,7
Mlakarica je zelo prilagodljiva in za bivališče ne potrebuje velikih vodnih površin, večkrat pa gnezdi tudi v gozdovih v okolici vodnih teles. Prehranjuje se z vodnimi rastlinami in manjšimi vodnimi živalmi. Na Goričkem je razširjena lokalno, največja populacija pa je v okolici Ledavskega jezera.	

Reglja *Anas querquedula*




Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2011-2014)
Gnezditveni status:	G?
Ocena populacije v KPG:	0 - 1 par
Vrsta zabeležena v:	0 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	20 - 30 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	2,0
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	SPEC 3
Rdeči seznam:	E2
Rdeči seznam (osnutek):	VU
Dodatek Direktive o pticah:	II/1
Št. prešteti parov v NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	0
Maksimalno parov na transektih 2012:	-
Povprečno parov na transektih 2012:	-
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Reglja je v Sloveniji zelo redka gnezdilka. Na Goričkem so gnezditveno sumljiva opazovanja omejena na Ledavsko jezero, kjer je zanjo primeren habitat – obsežne plitvine in bogata vodna ter obrežna vegetacija. V gnezditvenem času se prehranjuje z majhnimi vodnimi živalmi in rastlinskimi deli, po gnezditvi pa rastline v prehrani prevladajo. Je selivka na dolge razdalje, ki prezimuje v Afriki in se k nam vrne v začetku marca.	

Prepelica *Coturnix coturnix*




Vir podatkov za grafični prikaz:	tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste NOAGS (2001-2014), SIPKK, popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	200 - 250 parov
Vrsta zabeležena v:	11 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	1000 - 2000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	15,0
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	SPEC 3
Rdeči seznam:	V
Rdeči seznam (osnutek):	DD, LC?
Dodatek Direktive o pticah:	II/2 (kvalifikacijska vrsta za Goričko)
Št. prešteti parov v NOAGS (2003-2010):	3
Št. prešteti parov Goričko 2012:	21
Maksimalno parov na transektih 2012:	5
Povprečno parov na transektih 2012:	0,36
Indeks popis 2012 / NOAGS:	622,9
Prepelica prebiva na ekstenzivnih travnikih in manjših žitnih njivah, od koder njeno značilno oglašanje najlaže slišimo ponoči. Pogostejša je na vzhodnem delu Goriškega, verjetno zaradi boljše ohranjenosti tamkajšnje kmetijske krajine. Ker gre za nočno vrsto, je indeks popis 2012 / NOAGS verjetno previsok.	

Kosec *Crex crex*




Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2007-2014), Božič (2005), Denac <i>et al.</i> (2010)
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	5 - 10 parov
Vrsta zabeležena v:	0 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	250 - 350 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	2,5
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	SPEC 1
Rdeči seznam:	E2
Rdeči seznam (osnutek):	EN
Dodatek Direktive o pticah:	I
Št. prešteti parov v NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	0
Maksimalno parov na transektih 2012:	-
Povprečno parov na transektih 2012:	-
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Kosec je ptica ekstenzivno obdelanih, pozno košenih vlažnih travnikov. V Sloveniji je najbolj pogost na Ljubljanskem barju, na Goričkem pa je zelo redek. V vseslovenskem popisu kosca leta 2004 smo zabeležili le enega samca pri Vučji Gomili (Božič 2005), leta 2010 pa dva samca pri Pertoči (Denac <i>et al.</i> 2010). Tudi opazovanja zadnjih nekaj let kažejo na redno, vendar maloštevilno populacijo, vezano na vlažne travnike.	

Fazan *Phasianus colchicus*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	1000 - 1180 parov
Vrsta zabeležena v:	57 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	2,4 ± 0,2 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	9000 - 13000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	9,9
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	II/1, III/1
Št. prešteti parov v NOAGS (2003-2010):	150
Št. prešteti parov Goričko 2012:	203
Maksimalno parov na transektih 2012:	12
Povprečno parov na transektih 2012:	3,44
Indeks popis 2012 / NOAGS:	135,3
Fazan je na Goriškem najpogostejši na zahodnem delu nad Rogašovci ter na severnem delu nad Gornjimi Petrovci, kjer je tudi lovsko gojišče te vrste. Fazan sicer prebiva v odprti kulturni krajini, vendar je zaradi izpuščanja gojenih osebkov težko oceniti, koliko osebkov dejansko izvira iz prostoživeče populacije.	

Mali ponirek *Tachybaptus ruficollis*




Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2004-2014)
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	5 - 10 parov
Vrsta zabeležena v:	0 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	500 - 1000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	1,0
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	O1
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov v NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	0
Maksimalno parov na transektih 2012:	-
Povprečno parov na transektih 2012:	-
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Mali ponirek je gnezdilec bogato poraslih jezer, ribnikov, zadrževalnikov in drugih vodnih teles. Gnezdo je plavajoče, spleteno iz vodnega rastlinja. Hrani se z drobnimi vodnimi nevretenčarji in majhnimi ribami. Mladiči se pogosto prevažajo na hrbtu staršev. Na Goriškem je mali ponirek maloštevilen in lokalno razširjen gnezdilec - zgolj na Ledavskem in Hodoškem jezeru.	

Čopasti ponirek *Podiceps cristatus*



Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2010-2014), Vrezec (2004a)
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	15 - 25 parov
Vrsta zabeležena v:	0 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	100 - 200 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	13,3
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	V1
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	0
Maksimalno parov na transektih 2012:	-
Povprečno parov na transektih 2012:	-
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Čopastega ponirka srečamo na jezerih, ribnikih in bajerjih z bogato obrežno in vodno vegetacijo. Gnezdo si naredi iz vodnega rastlinja, z njim pa tudi pokrije jajca vsakič, ko gnezdo zapusti, da bi se nahranil. Precej nazaj pomaknjene noge izdajajo dobrega potapljavca. Hrani se z majhnimi ribami. Na Goriškem je čopasti ponirek redka gnezdilka, ki gnezdi na Ledavskem in Hodoškem jezeru. Na slednjem je Vrezec (2004a) maja 2004 opazoval en par.	


Čapljica *Ixobrychus minutus*



Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2004-2013)
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	7 - 9 parov
Vrsta zabeležena v:	0 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	70 - 130 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	8,0
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	SPEC 3
Rdeči seznam:	E2
Rdeči seznam (osnutek):	VU
Dodatek Direktive o pticah:	I (kvalifikacijska vrsta za Goričko)
Prešteto parov v NOAGS (2003-2010):	0
Prešteto parov Goričko 2012:	0
Maksimalno parov na transektih 2012:	-
Povprečno parov na transektih 2012:	-
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-


Čapljica je gnezdilka trstič z posameznimi grmiči. Najlažje jo opazujemo v zgodnjih jutranjih ali večernih urah, ko se samci raskavo oglašajo in spreletavajo. Hrani se z majhnimi ribami in vodnimi nevretenčarji. Na Goriškem jo lahko srečamo predvsem na Ledavskem jezeru, ki ima največje površine s habitatom, primernim zanjo, en par pa gnezdi tudi na Hodoškem jezeru (Vrezec 2004a).

Kvakač *Nycticorax nycticorax*




Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2008-2014)
Gnezditveni status:	G?
Ocena populacije v KPG:	0 - 3 parov
Vrsta zabeležena v:	0 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	10 - 20 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	10,0
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	SPEC 3
Rdeči seznam:	Ex ?
Rdeči seznam (osnutek):	VU
Dodatek Direktive o pticah:	I
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	0
Maksimalno parov na transektih 2012:	-
Povprečno parov na transektih 2012:	-
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Kvakač je gnezdec vrbovih sestojev ob rekah in jezerih. V Sloveniji je bilo njegovo gnezdenje doslej potrjeno le na Ljubljanskem barju in ob spodnjem toku reke Save. Na Goriškem so bili prvoletni osebk na Ledavskem jezeru sicer že opazovani, vendar so že znali dobro leteti in bi torej lahko prišli tudi od drugod.	

Siva čaplja *Ardea cinerea*




Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2010-2014), popis 2012
Gnezditveni status:	G?
Ocena populacije v KPG:	-
Vrsta zabeležena v:	3 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	1000 - 1500 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	-
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	O1
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	3
Maksimalno parov na transektih 2012:	1
Povprečno parov na transektih 2012:	0,05
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Siva čaplja je kolonijska gnezdilka, ki gnezdi v bližini rek in jezer. Gnezda so spletena visoko na drevju, na primer na vrbah ali topolih. Prehranjuje se z ribami, pogosto pa lovi tudi male sesalce na travnikih ali njivah. Med popisom leta 2012 smo jo zabeležili, a na Goričkem verjetno ne gnezdi.	

Bela štorlkja *Ciconia ciconia*




Vir podatkov za grafični prikaz:	monitoring SPA (2004-2013), Denac 2001 & 2010
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	10 - 12 parov
Vrsta zabeležena v:	10 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	204 - 239 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	5,0
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	SPEC 2
Rdeči seznam:	V
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	I (kvalifikacijska vrsta za Goričko)
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	10
Maksimalno parov na transektih 2012:	1
Povprečno parov na transektih 2012:	0,17
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Bela štorlkja gnezdi v naseljih ali njihovi neposredni bližini, prehranjuje pa se na travnikih, sveže zoranih njivah in ob vodi. V Sloveniji je njena populacija stabilna, v zadnjih desetletjih pa je svoj areal znatno razširila proti jugozahodu (Denac 2001 & 2010). Na Goričkem je maloštevilna gnezdilka, a gnezdi raztreseno po vsem območju. Lokacije, predstavljene na karti, se nanašajo na gnezda, zasedena z obiskovalkami ali gnezdečimi pari v obdobju 1999-2013.	

Črna štoklja *Ciconia nigra*




Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2007-2014)
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	4 - 5 parov
Vrsta zabeležena v:	0 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	40 - 60 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	9,0
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	SPEC 2
Rdeči seznam:	V
Rdeči seznam (osnutek):	NT
Dodatek Direktive o pticah:	I (kvalifikacijska vrsta za Goričko)
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	0
Maksimalno parov na transektih 2012:	-
Povprečno parov na transektih 2012:	-
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Črna štoklja je redka gnezdilka gozdnatih grap in nižinskih gozdov; je zelo plašna, njena ključna zahteva je mir na gnezdišču. Hrani se ob gozdnih potokih, gramoznicah, ribnikih, jezerih, stranskih rečnih rokavih in v rečnih strugah. Gnezdo s premerom okrog 1 m si navadno splete visoko na velikem drevju. Na Goričkem je maloštevilna gnezdilka, vezana na večje sklenjene gozdove (npr. ob Bukovniškem jezeru). Lokacije, predstavljene na karti razširjenosti, se ne nanašajo na gnezda, temveč na opazovanja v času gnezditve.	

Belorepec *Haliaeetus albicilla*




Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2009-2014)
Gnezditveni status:	G?
Ocena populacije v KPG:	1 par
Vrsta zabeležena v:	0 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	8 - 11 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	10,5
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	SPEC 1
Rdeči seznam:	E1
Rdeči seznam (osnutek):	VU
Dodatek Direktive o pticah:	I (kvalifikacijska vrsta za Goričko)
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	0
Maksimalno parov na transektih 2012:	-
Povprečno parov na transektih 2012:	-
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Belorepec, ki se redno pojavlja na Ledavskem jezeru, gnezdi najverjetneje čez mejo v Avstriji in jezero uporablja le kot prehranjevališče. Ta velika vrsta orla prične z gnezdenjem že v januarju. Gnezdo je velika struktura s premerom okoli 1 m, nameščena na visoko in debelo drevo. Prehranjuje se z ribami in vodnimi pticami.	

Kanja *Buteo buteo*



Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	300 - 400 parov
Vrsta zabeležena v:	43 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	1,1 ± 0,1 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	5000 - 8000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	5,4
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	O1
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	51
Št. prešteti parov Goričko 2012:	62
Maksimalno parov na transektih 2012:	3
Povprečno parov na transektih 2012:	1,05
Indeks popis 2012 / NOAGS:	122,6
Kanja prebiva v prepletu gozda, ki ga potrebuje za gnezdišče, in v odprti krajini, kjer lovi. Plen so predvsem mali sesalci, na katere preži z drevja, žic, zraka, včasih pa jih čaka kar na tleh. Na Goričkem je najpogostejša v njegovem osrednjem in severovzhodnem delu.	


Sršenar *Pernis apivorus*



Vir podatkov za grafični prikaz:	tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste NOAGS (2008-2013), popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	10 - 20 parov
Vrsta zabeležena v:	1 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	300 - 500 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	3,8
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	V
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	I (kvalifikacijska vrsta za Goričko)
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	2
Št. prešteti parov Goričko 2012:	1
Maksimalno parov na transektih 2012:	1
Povprečno parov na transektih 2012:	0,02
Indeks popis 2012 / NOAGS:	59,3
Sršenar prebiva v mozaični kulturni krajini z veliko gozda. Hrani se v glavnem z osami, ki jih s kremplji in kljunom izkopava iz njihovih gnezd v tleh. Gnezdo si splete na drevesu, vendar ga je težko najti, saj ga sršenar ves čas gnezdenja oblaaga z zelenimi vejami. Za populacijske ocene je to težavna vrsta, saj zahteva podrobnejše raziskave. Na Goričkem je sršenar maloštevilen gnezdec, ki se pojavlja razpršeno po vsem območju. Podatki, predstavljeni na sliki razširjenosti, se ponekod	


verjetno nanašajo na seleče se osebke, saj se obdobje selitve do določene mere prekriva z obdobjem gnezditve.

Skobec *Accipiter nisus*




Vir podatkov za grafični prikaz:	tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste NOAGS (2003-2014), popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	20 - 40 parov
Vrsta zabeležena v:	4 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	2000 - 3000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	1,2
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	V
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	13
Št. prešteti parov Goričko 2012:	4
Maksimalno parov na transektih 2012:	1
Povprečno parov na transektih 2012:	0,07
Indeks popis 2012 / NOAGS:	29,7
Skobec gnezdi v gozdu, pogosto pa lovi tudi v kmetijski krajini. Hrani se pretežno s pticami pevkami, ki jih lovi iz zasede in preseneti s hitrim napadom. Samica je večja od samca, zato praviloma lovi večji plen. Na Goričkem ni pogost, razširjen pa je dokaj enakomerno po vsem območju.	

Kragulj *Accipiter gentilis*




Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2010-2014), popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	10 - 20 parov
Vrsta zabeležena v:	2 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	500 - 1000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	2,0
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	V
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	2
Maksimalno parov na transektih 2012:	1
Povprečno parov na transektih 2012:	0,03
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Kragulj je gnezditelj presvetljenega gozda in večjih, starejših dreves. Njegova hrana so v glavnem večje ptice, ki jih lovi v gozdu. Na Goričkem je maloštevilen gnezditelj, a se pojavlja raztreseno po vsem območju. Zaradi svoje vezanosti na gozd je verjetno manj zaznaven in zato morda tudi številčno podcenjen.	

Postovka *Falco tinnunculus*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	300 - 400 parov
Vrsta zabeležena v:	22 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	2000 - 2500 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	15,6
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	da
Status SPEC:	SPEC 3
Rdeči seznam:	V1
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	25
Št. prešteti parov Goričko 2012:	25
Maksimalno parov na transektih 2012:	2
Povprečno parov na transektih 2012:	0,42
Indeks popis 2012 / NOAGS:	98,9
Postovka prebiva v odprti kmetijski krajini. Gnezdi na drevesih ali stavbah. Njena hrana so mali sesalci. Med lebdenjem v zraku pregleduje tla pod seboj in išče sledi njihovega urina, ki jih vidi v ultravijoličnem delu spektra. Na Goriškem je najpogostejša na severozahodu.	

Škrjančar *Falco subbuteo*




Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2010-2014), popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	10 - 15 parov
Vrsta zabeležena v:	1 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	300 - 600 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	1,7
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	V1
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	1
Maksimalno parov na transektih 2012:	1
Povprečno parov na transektih 2012:	0,02
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Škrjančar je redek gnezdilec na Goričkem, tudi na popisu smo zabeležili le en osebek. Habitat na Goričkem mu sicer ustreza: gnezdi v svetlem gozdu na drevesu, prehranjuje pa se nad odprtimi površinami; predvsem mu ustrezajo vlažni travniki. Lovi ptice, na primer lastovke in škrjance, ter večje leteče žuželke.	

Mokož *Rallus aquaticus*




Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2004-2011), Vrezec (2004a)
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	5 - 10 parov
Vrsta zabeležena v:	0 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	100 - 200 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	5,0
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	E2
Rdeči seznam (osnutek):	NT
Dodatek Direktive o pticah:	II/2
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	0
Maksimalno parov na transektih 2012:	-
Povprečno parov na transektih 2012:	-
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Mokožev življenjski prostor je močvirna vegetacija, zlasti trstičje. Za prehranjevanje potrebuje plitvine in blatne predele. Lovi pijavke, deževnike, polže, majhne rake, pajke in žuželke; predvsem jeseni in pozimi pa se hrani tudi z rastlinskimi deli. Zanimivo je njegovo oglašanje, saj spominja na kruljenje prašiča. Mokož je redek gnezdilca Ledavskega in Hodoškega jezera. Na slednjem sta bila leta 2004 zabeležena vsaj 2 para (Vrezec 2004a).	

Grahašta tukalica *Porzana porzana*




Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2012)
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	1 - 3 pari
Vrsta zabeležena v:	0 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	20 - 60 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	5,0
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	E2
Rdeči seznam (osnutek):	EN
Dodatek Direktive o pticah:	I
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	0
Maksimalno parov na transektih 2012:	-
Povprečno parov na transektih 2012:	-
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Glede globine vode je grahašta tukalica bolj občutljiva kot mala tukalica, saj ji ustreza le do nekako 15 cm, za prehranjevanje pa še nižja. Hrani se z majhnimi vodnimi živalmi in rastlinskimi deli. Kvakajoče svatovsko oglašanje samca lahko poslušamo le ponoči. Primerne življenjske razmere na Goričkem najde le na močvirnih travnikih severno od Ledavskega jezera.	

Mala tukalica *Porzana parva*




Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2003-2010)
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	2 - 4 pari
Vrsta zabeležena v:	0 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	20 - 50 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	8,6
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	E1
Rdeči seznam (osnutek):	VU
Dodatek Direktive o pticah:	I
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	0
Maksimalno parov na transektih 2012:	-
Povprečno parov na transektih 2012:	-
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Mala tukalica prebiva na vlažnih s trstom, šašjem, ločjem in bičjem poraslih površinah. Za gnezdenje potrebuje stara ali polomljena stebila vodnih rastlin, v katera vpne gnezdo. Hrani se z vodnimi nevretenčarji ter poganjki in semeni vodnih rastlin. Na Goričkem je bila zabeležena v trstišču Ledavskega jezera.	

Zelenonoga tukalica *Gallinula chloropus*




Vir podatkov za grafični prikaz:	tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste NOAGS (2003-2014), Vrezec (2004a)
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	20 - 30 parov
Vrsta zabeležena v:	0 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	750 - 1000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	2,9
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	V1
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	II/2
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	2
Št. prešteti parov Goričko 2012:	0
Maksimalno parov na transektih 2012:	-
Povprečno parov na transektih 2012:	-
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Zelenonoga tukalica prebiva na stoječih in počasi tekočih vodah, kjer si gnezdo naredi v zavetju vodnih rastlin. Je vsejeda. Na Goričkem je maloštevilna gnezdilka, zabeležena na Hodoškem (Vrezec 2004a) in Ledavskem jezeru ter na ribniku pri Križevcih.	

Liska *Fulica atra*




Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2010-2014), popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	25 - 40 parov
Vrsta zabeležena v:	1 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	300 - 500 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	8,1
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	O1
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	II/1, III/2
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	1
Maksimalno parov na transektih 2012:	1
Povprečno parov na transektih 2012:	0,02
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Liska je gnezdilka stoječih voda z bogato obvodno in vodno vegetacijo. Gnezdo zgradi iz odmrlega vodnega rastlinja, ki ga zasidra ob stebela bička, ločka in podobnih rastlin. Je izredno teritorialna, zato lahko spomladi pogosto opazujemo boje med posameznimi osebki. Na Goriškem prebiva na Ledavskem in Hodoškem jezeru.	

Priba *Vanellus vanellus*




Vir podatkov za grafični prikaz:	tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste NOAGS (2004-2013), popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	20 - 30 parov
Vrsta zabeležena v:	2 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	700 - 1000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	2,9
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	da
Status SPEC:	SPEC 2
Rdeči seznam:	V / V1 (v SV SLO)
Rdeči seznam (osnutek):	EN
Dodatek Direktive o pticah:	II/2
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	3
Št. prešteti parov Goričko 2012:	4
Maksimalno parov na transektih 2012:	2
Povprečno parov na transektih 2012:	0,07
Indeks popis 2012 / NOAGS:	118,6
Priba je prvotno gnezdilka močvirnih travnikov z nizkimi travami in ekstenzivnih pašnikov. V času gnezditve ji ustreza nizko rastje, ki ji omogoča dober pregled nad okolico. Lahko gnezdi kolonijsko in je tako tudi uspešnejša pri preganjanju plenilcev. Večina slovenske populacije dandanes gnezdi na njivah, ki pa so zanje nekakšna ekološko past, saj zaradi kmetijskih del (oranje, branje, setev, škropljenje) propade večina legel (Aleš 2005). Na Goriškem je maloštevilna gnezdilka na njivah.	

Mali martinec *Actitis hypoleucos*




Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2008-2014)
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	1 - 3 pari
Vrsta zabeležena v:	0 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	185 - 300 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	0,8
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	SPEC 3
Rdeči seznam:	E2
Rdeči seznam (osnutek):	NT
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	0
Maksimalno parov na transektih 2012:	-
Povprečno parov na transektih 2012:	-
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Mali martinec gnezdi na prodiščih ter na peščenih ali blatnih obalah jezer. Slednje so njegov življenjski prostor na Goričkem. Hrani se z manjšimi nevretenčarji, ki jih pobira s tal in iz špranj med kamenjem. Gnezdo je skrito v zavetju višjega rastlinja ali grmovja, lahko do nekaj 10 m od vode.	

Rdečenogi martinec *Tringa totanus*




Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2010)
Gnezditveni status:	G?
Ocena populacije v KPG:	0 - 1 par
Vrsta zabeležena v:	0 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	10 - 20 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	3,3
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	SPEC 2
Rdeči seznam:	E1
Rdeči seznam (osnutek):	EN
Dodatek Direktive o pticah:	II/2
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	0
Maksimalno parov na transektih 2012:	-
Povprečno parov na transektih 2012:	-
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Rdečenogi martinec prebiva na vodnih telesih z obsežnimi plitvinami in poloji. V Sloveniji gnezdi le na nekaj lokacijah. Na Goriškem gnezdenje še ni bilo potrjeno, vendar ga je Štumberger (2003a) na osnovi opazovanj v letih 1991 in 1993 štel za občasnega gnezdilca, katerega gnezdenje na Ledavskem jezeru je odvisno predvsem od gladine vode. V gnezditvenem času in ustreznem habitatu je bil opazovan tudi leta 2010.	

Domači golob *Columba livia* (domest.)



Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	860 - 1030 parov
Vrsta zabeležena v:	16 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	2,1 ± 0,2 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	18000 - 30000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	3,9
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	-
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	-
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	81
Št. prešteti parov Goričko 2012:	62
Maksimalno parov na transektih 2012:	12
Povprečno parov na transektih 2012:	1,05
Indeks popis 2012 / NOAGS:	76,6
Domači golob na Goriškem ni zelo pogost, saj mu ekstenzivna krajina z raztresenimi naselji ne ustreza. Bolj domače se počuti v velikih naseljih, kjer gnezdi na podstrešjih stavb. Prehranjuje se na tleh z različnimi semeni, plodovi in ostanki hrane.	


Duplar *Columba oenas*



Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	300 - 400 parov
Vrsta zabeležena v:	32 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	1,0 ± 0,1 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	1000 - 3000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	17,5
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	da
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	E2
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	II/2
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	15
Št. prešteti parov Goričko 2012:	65
Maksimalno parov na transektih 2012:	6
Povprečno parov na transektih 2012:	1,10
Indeks popis 2012 / NOAGS:	428,4


Duplar gnezdi v večjih sestojih drevja v kulturni krajini, in sicer v duplih. Prehranjuje se s poganjki in semeni, priložnostno tudi z manjšimi nevretenčarji. Vzhodni del Goriškega ima eno izmed največjih gostot duplarja v Sloveniji, spodbudno pa je tudi naraščanje populacije na Goriškem v zadnjih letih.

Grivar *Columba palumbus*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	1300 - 1510 parov
Vrsta zabeležena v:	56 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	3,0 ± 0,2 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	25000 - 30000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	5,1
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	da
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	O1
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	II/1, III/1
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	150
Št. prešteti parov Goričko 2012:	193
Maksimalno parov na transektih 2012:	10
Povprečno parov na transektih 2012:	3,27
Indeks popis 2012 / NOAGS:	128,6
Grivar gnezdi v gozdovih, parkih in na večjih vrtovih. Gnezdo je iz vejic, rahlo grajeno. Prehranjuje se na njivah in travnikih s poganjki, semeni in plodovi. Na Goričkem ima dve izraziti populacijski jedri: na severozahodu, kjer mu ustreza intenzivnejša kulturna krajina nad Rogašovci, ter na severovzhodu v ekstenzivni krajini pod Šalovci.	

Turška grlica *Streptopelia decaocto*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	430 - 560 parov
Vrsta zabeležena v:	28 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	1,1 ± 0,1 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	28000 - 36000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	1,5
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	O1
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	II/2
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	54
Št. prešteti parov Goričko 2012:	81
Maksimalno parov na transektih 2012:	7
Povprečno parov na transektih 2012:	1,37
Indeks popis 2012 / NOAGS:	150,2
Turška grlica je vezana na bližino človeških bivališč, na Goričkem pa gnezdi predvsem na zahodnem delu. Gnezdi lahko vse leto, če le ima na voljo dovolj hrane. To so v glavnem zrnje, semena, poganjki in občasno žuželke. Gnezdo je rahlo iz vejic in pogosto se zgodi, da zaradi premikov vej ali vetra razpade.	

Divja grlica *Streptopelia turtur*



Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	200 - 300 parov
Vrsta zabeležena v:	31 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	1,6 ± 0,2 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	3500 - 5000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	5,9
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	da
Status SPEC:	SPEC 3
Rdeči seznam:	V1
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	II/2
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	78
Št. prešteti parov Goričko 2012:	79
Maksimalno parov na transektih 2012:	7
Povprečno parov na transektih 2012:	1,34
Indeks popis 2012 / NOAGS:	101,9
Prebiva predvsem v toplejših predelih na vzhodu Goriškega. Površine v prahi, požete njive in kolovoze uporablja kot prehranjevališča. Gnezdi v presvetljenih gozdičih, gozdnih otokih in pasovih drevja. Hrani se z zrnjem, semeni, poganjki in žuželkami. Je precej bolj plašna kot njena sorodnica, turška grlica.	

Kukavica *Cuculus canorus*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	510 - 640 parov
Vrsta zabeležena v:	58 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	1,2 ± 0,1 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	16000 - 38000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	2,1
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	O1
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	98
Št. prešteti parov Goričko 2012:	189
Maksimalno parov na transektih 2012:	9
Povprečno parov na transektih 2012:	3,20
Indeks popis 2012 / NOAGS:	193,3
Kukavica je glede gnezdišča oziroma mesta poganjanja jajc nezahtevna; njena glavna hrana so žuželke, predvsem odlačene gosenice metuljev. Posamezna samica se praviloma specializira za gostiteljsko vrsto ptice, ki ji podtika jajca. Kukavičja jajca so po velikosti, obliki in obarvanosti skoraj povsem enaka kot gostiteljeva. Ko se iz njih izvalijo mladiči, iz gnezda takoj vržejo preostala jajca, tako da so sami deležni vse hrane, ki jo nosijo krušni starši. Na Goričkem je zlasti pogosta na vzhodnem delu.	

Velika uharica *Bubo bubo*


Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	1 par
Vrsta zabeležena v:	0 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	80 - 100 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	1,1
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	SPEC 3
Rdeči seznam:	E2
Rdeči seznam (osnutek):	NT
Dodatek Direktive o pticah:	I
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	0
Maksimalno parov na transektih 2012:	-
Povprečno parov na transektih 2012:	-
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Habitat velike uharice so skalne stene, potrebuje pa tudi bližino odprtega območja, kjer se prehranjuje. Pleni različne večje živali – ptice, ježe, male sesalce, domače mačke in podobno. Na Goričkem gnezdi le en par velike uharice, in sicer na zahodnem delu (karte razširjenosti zaradi občutljivosti vrste ne prikazujemo). To je edino znano gnezdo te vrste v Prekmurju. Z Goričkega obstaja še en podatek s konca gnezditvenega obdobja: julija 1999 je bila opazovana v Hodošu, pri čemer bi lahko šlo za osebek, ki je gnezdil na Madžarskem (Kosi 2000). Novembra 2006 je bil en osebek zbit v Fikšincih na zahodu Goričkega (Bračko 2007).	

Mala uharica *Asio otus*




Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2004-2014)
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	50 – 70 parov
Vrsta zabeležena v:	0 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	1800 – 2200 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	3,0
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	O1
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	0
Maksimalno parov na transektih 2012:	-
Povprečno parov na transektih 2012:	-
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Mala uharica prebiva v odprti kmetijski krajini z mejicami in gozdnimi otoki. Gnezdi v starih gnezdih srak in sivih vran na iglavcih. Hrani se z malimi sesalci, predvsem mišmi in voluharicami (Tome 2000 & 2009). Na Goričkem je precej redkejša od lesne sove in se pojavlja raztreseno po vsem območju.	

Lesna sova *Strix aluco*



Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2004-2014), popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	200 - 250 parov
Vrsta zabeležena v:	1 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	5000 - 9100 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	3,2
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	O1
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	1
Maksimalno parov na transektih 2012:	1
Povprečno parov na transektih 2012:	0,02
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Lesno sovo so zaradi nočne aktivnosti dnevni popisi v letu 2012 zajeli le po naključju. Gnezdi v duplu, priprave na gnezdenje pa se začno že v zimskem času. Hrani se z malimi sesalci in pticami, ki jih lahko lovi tudi na zalogo. Na Goričkem je to najpogostejša vrsta sove, ki je splošno razširjena po vsem območju.	


Pegasta sova *Tyto alba*



Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2006-2014)
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	1 - 3 pari
Vrsta zabeležena v:	0 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	80 - 130 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	1,9
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	SPEC 3
Rdeči seznam:	E2
Rdeči seznam (osnutek):	VU
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	0
Maksimalno parov na transektih 2012:	-
Povprečno parov na transektih 2012:	-
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Pegasta sova živi v odprti krajini s travniki in njivami. Gnezdi na podstrešjih gospodarskih poslopij, v cerkvenih zvonikih, zasede pa tudi gnezdilnice. Hrani se z malimi sesalci, tako da je občutljiva za zastrupitve z rodenticidi (strupi za glodalce). Zaradi nesimetrično nameščenih ušesnih odprt in izjemno ostrega sluha lahko lovi v popolni temi, lokacijo plena pa določi le s pomočjo zvoka. Na Goriškem je maloštevilna gnezdilka vzhodnega dela območja. V raziskavi prehrane v letih 1997 in	


1998 so bili njeni izbljuvki v gnezditvenem času odkriti v Domanjševcih, Adrijancih in Hodošu (Janžekovič & Ficko 2000), od koder pa je zaradi zamreževanja cerkva že izginila.

Čuk *Athene noctua*




Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2004-2014)
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	5 - 10 parov
Vrsta zabeležena v:	0 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	100 - 150 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	6,0
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	SPEC 3
Rdeči seznam:	E1
Rdeči seznam (osnutek):	EN
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	0
Maksimalno parov na transektih 2012:	-
Povprečno parov na transektih 2012:	-
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Čuk je toploljubna vrsta sove, ki prebiva v mozaični krajini in se ne izogiba človekove bližine. Hrani se z velikimi žuželkami in malimi sesalci. Gnezdi v duplih ali v luknjah v stavbah. Na Goričkem se pojavlja raztreseno in nikjer ni pogost. Čuk je bil v grški mitologiji spremljevalec in simbol boginje modrosti Atene, od koder izvira tudi njegovo rodovno ime (<i>Athene</i>).	

Veliki skovik *Otus scops*




Vir podatkov za grafični prikaz:	Štumberger (1997), Rubinič <i>et al.</i> (2004), DOPPS neobjavljeno (popis 2012 v projektu Upkač)
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	60 - 70 parov
Vrsta zabeležena v:	0 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	600 - 1000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	8,1
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	SPEC 2
Rdeči seznam:	E2
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	- (kvalifikacijska vrsta za Goričko)
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	0
Maksimalno parov na transektih 2012:	-
Povprečno parov na transektih 2012:	-
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-




Upad populacije velikega skovika na Goričkem v obdobju 1997-2013. Na grafikonu so prikazani rezultati štetja teritorialnih samcev in ne ocene velikosti populacije.

Podhujka *Caprimulgus europaeus*




Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2012-2014)
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	5 - 10 parov
Vrsta zabeležena v:	0 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	1000 - 1500 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	0,2
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	SPEC 2
Rdeči seznam:	E2
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	I
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	0
Maksimalno parov na transektih 2012:	-
Povprečno parov na transektih 2012:	-
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Podhujka prebiva na suhih travnikih, posejanih z grmovjem in posameznimi drevesi, ter v presvetljenih borovih gozdovih. V Sloveniji je najpogostejša na Krasu. Gnezdo je na tleh, v njem sta običajno le dve jajci. Zaradi varovalne obarvanosti, podobne lubju, jo le težko opazimo. Najraje poje v toplih brezvetrnih nočeh s polno luno. Kljub vsaj tu in tam primernemu habitatu in obilici letečih žuželk, ki so njena glavna hrana, smo jo na Goričkem zabeležili le trikrat, kar jo uvršča med redke gnezdilke.	

Hudournik *Apus apus*




Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2010-2013), popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	10 - 20 parov
Vrsta zabeležena v:	2 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	3000 - 5000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	0,4
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	O1
Rdeči seznam (osnutek):	NT
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	3
Maksimalno parov na transektih 2012:	2
Povprečno parov na transektih 2012:	0,05
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Gnezdišča hudournika so predvsem špranje in luknje na (višjih) stavbah. Hudourniki v zraku preživijo večino svojega življenja, saj se tam tudi pari in spijo. Na trdna tla se spustijo le v času gnezdenja. Zaradi kratkih in šibkih nog ne morejo vzleteti s tal, temveč potrebujejo neko višjo strukturo, s katere se poženejo v zrak. Hranijo se z letečimi žuželkami, ki jih lovijo v široko razprta usta. Mladiči lahko nekaj dni preživijo brez hrane v stanju otrplosti. Na Goriškem je maloštevilčen gnezdišče vzhodnega dela območja.	

Smrdokavra *Upupa epops*




Vir podatkov za grafični prikaz:	tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste NOAGS (2001-2014), SIPKK, popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	20 - 40 parov
Vrsta zabeležena v:	5 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	450 - 750 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	5,0
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	da
Status SPEC:	SPEC 3
Rdeči seznam:	E1
Rdeči seznam (osnutek):	NT
Dodatek Direktive o pticah:	- (kvalifikacijska vrsta za Goričko)
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	32
Št. prešteti parov Goričko 2012:	5
Maksimalno parov na transektih 2012:	1
Povprečno parov na transektih 2012:	0,08
Indeks popis 2012 / NOAGS:	15,6

Vodomec *Alcedo atthis*



Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2010-2014)
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	7 - 12 parov
Vrsta zabeležena v:	0 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	200 - 300 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	3,8
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	SPEC 3
Rdeči seznam:	E2
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	I (kvalifikacijska vrsta za Goričko)
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	0
Maksimalno parov na transektih 2012:	-
Povprečno parov na transektih 2012:	-
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Vodomec potrebuje za gnezdenje peščeno steno, v katero si izkoplje okoli 1 m dolg rov, na koncu katerega je kamrica za mladiče. Prehranjuje se z majhnimi ribami, ki jih lovi v čisti in ne pregloboki vodi, na primer v plitvih zatokih in stranskih rokavih. Na Goriškem prebiva predvsem ob reki Krki ter na Ledavskem jezeru.	


Zlatovranka *Coracias garrulus*



Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2001-2014), Bedič (2003)
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	0 - 1 parov
Vrsta zabeležena v:	0 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	0 - 1 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	100,0
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	SPEC 2
Rdeči seznam:	E1
Rdeči seznam (osnutek):	RE
Dodatek Direktive o pticah:	I
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	0
Maksimalno parov na transektih 2012:	-
Povprečno parov na transektih 2012:	-
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Zlatovranka naseljuje mozaično kmetijsko krajino z ekstenzivnimi, prostorsko in časovno postopno košenimi travniki, manjšimi njivami, gozdnimi otoki in drevesnimi mejicami. V Sloveniji je nazadnje potrjeno gnezdenje leta 2005, in sicer v dolini Velke v Slovenskih goricah. Do sredine devetdesetih let 20. stol. je gnezdenje tudi na Goričkem v Ledavski dolini (B. Štumberger <i>osebno</i>), kasneje pa je bila opazovana le še v času pognezditvene disperzije (B. Štumberger, T. Berce in R. Gjergjek <i>osebno</i>). Leta 2001 se je en osebek hranil med Dolenci in Hodošem, vendar tam ni gnezdil (Bedič 2003).	


Avgusta 2012 sta se dva osebka nekaj dni zadrževala v Sotini, nato pa je bil nekaj dni kasneje opažen še en osebek, ki je na Goričkem ostal do konca avgusta (R. Gjergjek *osebno*). Leto kasneje, 2013, je bilo konec maja posneto svatovanje para, vendar gnezdenje iz neznanega vzroka ni bilo uspešno. Za zlatovranko so bili pripravljeni tudi številni varstveni ukrepi: nameščanje gnezdilnic in zaščitne pločevine okoli gnezditvenih drogov, nameščanje lovilnih prež ter postopna košnja travnikov (Gjergjek 2013). Leta 2014 je par uspešno speljal pet mladičev, kar po 9 letih pomeni prvo ponovno gnezdenje zlatovranke v Sloveniji.

Črna žolna *Dryocopus martius*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	160 - 230 parov
Vrsta zabeležena v:	26 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	0,4 ± 0,1 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	4000 - 8000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	3,3
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	O1
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	I (kvalifikacijska vrsta za Goričko)
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	22
Št. prešteti parov Goričko 2012:	36
Maksimalno parov na transektih 2012:	4
Povprečno parov na transektih 2012:	0,61
Indeks popis 2012 / NOAGS:	164,3
Črna žolna ni izbirčna glede kvalitete gozda, čeprav najvišje gostote dosega v odraslem gozdu z veliko debelega drevja. Hrani se z lesnimi mravljami in ličinkami različnih hroščev, ki živijo v odmirajočem lesu. Pri tem z močnim kljunom izdolbe globoke luknje v les. Njena gnezditvena dupla v naslednjih letih uporabljajo mnoge ptice, na primer kavke, škorci in manjše sove. Na Goriškem ima tri zgoščitve, in sicer med Čepinci in Hodošem, med Gradom in Šulinci ter v okolici Moščancev.	

Zelena žolna *Picus viridis*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	580 - 720 parov
Vrsta zabeležena v:	49 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	1,4 ± 0,2 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	9000 - 15000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	5,4
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	da
Status SPEC:	SPEC 2
Rdeči seznam:	E2
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	47
Št. prešteti parov Goričko 2012:	83
Maksimalno parov na transektih 2012:	4
Povprečno parov na transektih 2012:	1,41
Indeks popis 2012 / NOAGS:	175,8
Prebiva v polodprti mozaični krajini z gozdnimi otoki, mejicami in visokodebelnimi sadovnjaki. Tudi v prehrani zelene žolne prevladujejo mravlje, ki jih išče predvsem na tleh (npr. na košenih travnikih). Z izredno dolgim lepljivim jezikom seže v mravljišča in ga nato, obloženega z mravljami ter njihovimi ličinkami in bubami potegne v kljun. Zelo pogosta je na osrednjem in severozahodnem delu Goričkega.	

Pivka *Picus canus*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	160 - 200 parov
Vrsta zabeležena v:	25 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	3000 - 6000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	4,0
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	SPEC 3
Rdeči seznam:	V1
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	I (kvalifikacijska vrsta za Goričko)
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	7
Št. prešteti parov Goričko 2012:	33
Maksimalno parov na transektih 2012:	3
Povprečno parov na transektih 2012:	0,56
Indeks popis 2012 / NOAGS:	489,4
V prehrani pivke prevladujejo mravlje, vendar jih dopolnjuje z drugimi žuželkami in rastlinsko hrano. Prebiva v mozaični krajini z zadosti gozda. Njena dupla so pomembna za sekundarne duplarje, na primer škorce in sinice. Svatovski klic »piv-piv-piv-piv« je botroval njenemu imenu pa tudi ljudskemu reku, da nekdo pije kot žolna. Na Goriškem je najpogostejša na vzhodu, med Domanjševci in Šalovci.	

Veliki detel *Dendrocopos major*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	3420 - 3750 parov
Vrsta zabeležena v:	54 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	7,8 ± 0,4 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	52000 - 105000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	4,6
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	O1
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	79
Št. prešteti parov Goričko 2012:	167
Maksimalno parov na transektih 2012:	13
Povprečno parov na transektih 2012:	2,83
Indeks popis 2012 / NOAGS:	210,8
Glede habitata je veliki detel nezahtevna vrsta, saj gnezdi v vseh vrstah gozdov in v parkih. V prehrani ima več rastlinske hrane kot druge vrste detlov. Na Goričkem je najpogostejši na vzhodnem delu, s pozornost zbujajočimi gostotami v okolici Kobilja in Domanjševcev.	

Srednji detel *Dendrocopos medius*




Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2010-2014), popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	30 - 50 parov
Vrsta zabeležena v:	2 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	2000 - 3300 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	1,5
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	V
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	I
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	2
Maksimalno parov na transektih 2012:	1
Povprečno parov na transektih 2012:	0,03
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Na Goriškem je srednji detel redek gnezdilca, ki naseljuje predvsem stare hrastove gozdove. Za gnezdenje potrebuje odmrle in odmirajoča drevesa, saj ima šibkejši kljun kot večje vrste detlov. Hrani se z žuželkami, ki jih v glavnem pobira s površine vej visoko v krošnjah. Bobna zelo poredkoma.	

Mali detel *Dendrocopos minor*



Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2010-2014), popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	120 - 180 parov
Vrsta zabeležena v:	7 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	2500 - 3500 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	5,0
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	V
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	8
Maksimalno parov na transektih 2012:	2
Povprečno parov na transektih 2012:	0,14
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Na Goriškem je mali detel redek gnezditelj, vezan je predvsem na presvetljen listnat ali mešan gozd z mehkolesnimi vrstami (vrbe, topoli, jelše). Če je gozd strnjen, malega detla najdemo zlasti na robu. Zaradi šibkejšega kljuna podobno kot srednji detel potrebuje zmehčan, odmirajoč les, da lahko izteše gnezditelno duplo. Hrani se z žuželkami in njihovimi ličinkami, večinoma na tanjših odmrlih vejah.	


Vijeglavka *Jynx torquilla*



Vir podatkov za grafični prikaz:	tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste NOAGS (2003-2014), SIPKK, popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	160 - 240 parov
Vrsta zabeležena v:	31 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	0,4 ± 0,1 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	5000 - 10000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	2,7
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	da
Status SPEC:	SPEC 3
Rdeči seznam:	V
Rdeči seznam (osnutek):	NT
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	29
Št. prešteti parov Goričko 2012:	48
Maksimalno parov na transektih 2012:	5
Povprečno parov na transektih 2012:	0,81
Indeks popis 2012 / NOAGS:	167,5
Vijeglavka prebiva predvsem v sadovnjakih ali sadovnjakom podobnih drevesnih sestojih. Njena glavna hrana so mravlje. Zaradi razmeroma šibkega kljuna si edina izmed detlov in žoln ni sposobna sama iztesati dupla. Med detli in žolnami je edina selivka na dolge razdalje, ki prezimuje v tropski Afriki. Če jo zmotimo na gnezdu, bo glavo zvijala v vse smeri, od tod tudi njeno ime. Na	


Goričkem presenetljivo ni zelo pogosta; veliko število parov je bilo prešteti predvsem v prvem popisu, ko smo beležili domnevno še seleče se osebkke.

Poljski škrljanec *Alauda arvensis*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	500 - 700 parov
Vrsta zabeležena v:	19 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	2,4 ± 0,2 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	10000 - 18000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	4,3
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	da
Status SPEC:	SPEC 3
Rdeči seznam:	V1
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	II/2
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	108
Št. prešteti parov Goričko 2012:	66
Maksimalno parov na transektih 2012:	9
Povprečno parov na transektih 2012:	1,12
Indeks popis 2012 / NOAGS:	61,2
Poljski škrljanec je gnezdilec odprte krajine, njiv in travnikov. Samec označuje teritorij s svatovskim letom, med katerim se pojoč dvigne visoko v zrak, nato pa se kot kamen spusti proti tlu. Gnezdo je na tleh, praviloma v zelo nizki vegetaciji. Zelo mu ustreza tudi praha. Hrani se s semeni in nevretenčarji. Na Goričkem je pogost predvsem na vzhodu območja v dolinah.	

Čopasti škrjanec *Galerida cristata*




Vir podatkov za grafični prikaz:	tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste NOAGS (2003-2014), popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	30 - 50 parov
Vrsta zabeležena v:	3 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	750 - 900 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	4,8
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	da
Status SPEC:	SPEC 3
Rdeči seznam:	V
Rdeči seznam (osnutek):	NT
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	15
Št. prešteti parov Goričko 2012:	3
Maksimalno parov na transektih 2012:	1
Povprečno parov na transektih 2012:	0,05
Indeks popis 2012 / NOAGS:	19,8
Prebiva na neobdelanih njivskih površinah in različnih nasutjih (gradbišča, ruderalne površine). Pogosto ga lahko opazujemo na peščenih cestnih robvih ali na njivah, kjer pobira semena in manjše nevretenčarje. Čopasti škrjanec je na Goriškem redek gnezdilec, najdemo ga predvsem na jugovzhodu, kjer se gričevnata pokrajina malce izravna.	

Hribski škranec *Lullula arborea*




Vir podatkov za grafični prikaz:	tetrade NOAGS (2003-2010), popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	40 - 80 parov
Vrsta zabeležena v:	11 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	3300 - 4400 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	1,6
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	da
Status SPEC:	SPEC 2
Rdeči seznam:	E2 (celinska SLO)/ V1 (submediteran)
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	I (kvalifikacijska vrsta za Goričko)
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	27
Št. prešteti parov Goričko 2012:	13
Maksimalno parov na transektih 2012:	2
Povprečno parov na transektih 2012:	0,22
Indeks popis 2012 / NOAGS:	48,2
Hribski škranec je ena izmed vrst, ki so prizadete zaradi izginjanja mozaične krajine s travniki in mejicami. V zadnjem desetletju in pol je na Goriškem upadel več kot za polovico. Ključni zanj so ekstenzivni travniki z dovolj golih tal, kjer se prehranjuje, ter posamezna drevesa in grmi, s katerih poje. Na Goriškem je razširjen predvsem na vzhodnem delu, pojavlja pa se tako v dolinah kot na pobočjih.	

Kmečka lastovka *Hirundo rustica*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	3000 - 5000 parov
Vrsta zabeležena v:	48 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	12,7 ± 0,5 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	180000 - 290000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	1,7
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	da
Status SPEC:	SPEC 3
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	276
Št. prešteti parov Goričko 2012:	259
Maksimalno parov na transektih 2012:	22
Povprečno parov na transektih 2012:	4,39
Indeks popis 2012 / NOAGS:	93,7
Kmečka lastovka je vezana na stavbe v kulturni krajini, predvsem hleve z živino. Iz blata grajeno skledasto gnezdo je zgoraj odprto in pogosto oprto na različne strukture v hlevu (žice, luči). Prehranjuje se v letu z letečimi žuželkami. Jeseni se kmečke lastovke že precej pred odhodom na prezimovališča zbirajo v velike, tudi nekaj tisoč glave jate, ki skupaj prenočujejo v trstičju ali grmičevju. Na Goriškem je pogosta gnezdilka, z izrazitimi zgostitvami na severozahodu in jugu območja.	

Mestna lastovka *Delichon urbicum*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	500 - 700 parov
Vrsta zabeležena v:	9 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	2,0 ± 0,2 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	50000 - 100000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	0,8
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	SPEC 3
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	32
Št. prešteti parov Goriško 2012:	20
Maksimalno parov na transektih 2012:	7
Povprečno parov na transektih 2012:	0,34
Indeks popis 2012 / NOAGS:	62,4
Mestna lastovka gnezdi predvsem na hišah (pod napuščem strehe, v kotu okna, pod balkonom), pogosto kolonijsko. Največje kolonije so na velikih stavbah (npr. gasilski domovi, gospodarska poslopja, večstanovanjske stavbe). Njeno gnezdo je grajeno iz blata, ki ga pobira ob lužah. V nasprotju z gnezdom kmečke lastovke je njeno kroglaste oblike in ima vhod ob strani. Hrana je podobna kot pri kmečki lastovki, in sicer leteče žuželke. V divjini živče populacije, npr. v Julijskih Alpah, gnezdiijo na skalnatih stenah. Na Goriškem je pogosta gnezdilka s pozornost zbujajočimi gostotami v okolici Križevcev.	

Drevesna cipa *Anthus trivialis*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	50 - 100 parov
Vrsta zabeležena v:	8 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	30000 - 50000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	0,2
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	da
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	10
Maksimalno parov na transektih 2012:	2
Povprečno parov na transektih 2012:	0,17
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Drevesna cipa je ptica gozdnega roba, jas, posek in drugih presvetlitev v gozdu. Gnezdo je na tleh, dobro skrito med rastlinjem. Hrani se z žuželkami, občasno tudi semeni. Med popisi za NOAGS drevesne cipe na Goričkem presenetljivo nismo zabeležili. Njeno pojavljanje v zadnjem času lahko morda pripišemo zaraščajoči se krajini z bogatim zeliščnim slojem. Gnezditvena populacija na Goričkem je za zdaj maloštevilna in raztresena po vsem območju.	

Bela pastirica *Motacilla alba*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	1880 - 2130 parov
Vrsta zabeležena v:	48 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	$4,3 \pm 0,3$ parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	130000 - 160000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	1,4
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	59
Št. prešteti parov Goričko 2012:	88
Maksimalno parov na transektih 2012:	4
Povprečno parov na transektih 2012:	1,49
Indeks popis 2012 / NOAGS:	149,2
Pogosta gnezdilka v naseljih, gnezdi v naravnih in umetnih votlinah, npr. v škarpah, na mostovih ali pod strešniki. Jeseni lahko jate do nekaj 10 osebkov opazujemo na skupinskih prenočiščih na drevju. Med neprestanim zibanjem repa nabira hrano zlasti ob robovih cest, na pokošenih površinah in dvoriščih. Na Goričkem je pogosta gnezdilka s tremi pozornost zbujujočimi zgostitvami med Rogašovci in Kuzmo, med Bodonci in Fokovci ter med Motvarjevci in Kobiljem.	

Rumena pastirica *Motacilla flava*




Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2011-2014), popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	5 - 10 parov
Vrsta zabeležena v:	1 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	3400 - 3800 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	0,2
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	da
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	V
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	1
Maksimalno parov na transektih 2012:	1
Povprečno parov na transektih 2012:	0,02
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Rumena pastirica je v Sloveniji najpogostejša na vlažnih travnikih Cerkniškega jezera. Gnezdi na tleh in se hrani z majhnimi nevretenčarji. Njeno staro ime je ovčarica, saj se na selitvi pogosto ustavlja na pašnikih in se prehranjuje z žuželkami, ki jih splašijo pašne živali. Na Goričkem je redka, gnezdi pa v travnatih robovih med njivami ali ob jarkih.	

Siva pastirica *Motacilla cinerea*




Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2009-2014), popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	15 - 25 parov
Vrsta zabeležena v:	3 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	5000 - 7500 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	0,3
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	3
Maksimalno parov na transektih 2012:	1
Povprečno parov na transektih 2012:	0,05
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Siva pastirica prebiva ob hitro tekočih, senčnatih potokih. Hrani se z vodnimi žuželkami, predvsem njihovimi ličinkami. Gnezdo je ob vodi, skrito med korenine drevja, ali pod mostom. Na Goričkem je redka gnezdilka ob manjših potokih v grapah.	

Taščica *Erithacus rubecula*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	6380 - 6830 parov
Vrsta zabeležena v:	54 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	14,3 ± 0,5 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	520000 - 740000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	1,0
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	236
Št. prešteti parov Goričko 2012:	326
Maksimalno parov na transektih 2012:	19
Povprečno parov na transektih 2012:	5,53
Indeks popis 2012 / NOAGS:	138,1
Taščica je gozdna vrsta, ki ni izbirična glede tipa gozda. Potrebuje bogat zeliščni in grmovni sloj. Samci so izredno teritorialni in se zaganjajo tudi v lastno podobo (npr. v oknu ali avtomobilskem ogledalu). Je ena izmed prvih pevk, ki se oglašijo zjutraj, in ena zadnjih zvečer. Hrani se z nevretenčarji, jeseni tudi z različnimi manjšimi plodovi. Na Goriškem je pogosta in splošno razširjena gnezdilka, ki je še posebej številčna v osrednjem, severovzhodnem in jugovzhodnem delu območja.	

Slavec *Luscinia megarhynchos*




Vir podatkov za grafični prikaz:	tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste NOAGS (2003-2014), popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	40 - 70 parov
Vrsta zabeležena v:	3 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	17000 - 22000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	0,3
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	da
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	V
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	12
Št. prešteti parov Goričko 2012:	3
Maksimalno parov na transektih 2012:	1
Povprečno parov na transektih 2012:	0,05
Indeks popis 2012 / NOAGS:	25,4
Slavec je gnezdec grmišč, gnezdo si uredi na tleh ali malce nad njimi. Prehranjuje se z žuželkami. Na Goriškem je zlasti pogost v grmiščih vzhodnega dela območja, in sicer v dolinah. Videti je, da je njegova populacija tu v zadnjih letih upadla.	

Pogorelček *Phoenicurus phoenicurus*




Vir podatkov za grafični prikaz:	tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste NOAGS (2008-2013), popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	20 - 40 parov
Vrsta zabeležena v:	2 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	3500 - 5200 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	0,7
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	da
Status SPEC:	SPEC 2
Rdeči seznam:	E2
Rdeči seznam (osnutek):	NT
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	3
Št. prešteti parov Goričko 2012:	3
Maksimalno parov na transektih 2012:	2
Povprečno parov na transektih 2012:	0,05
Indeks popis 2012 / NOAGS:	89,0
Pogorelček za gnezdenje potrebuje dupla in poldupla, prehranjuje pa se na košenih površinah z zaplatami golih tal. Včasih gnezdi v mešanem paru s sorodno šmarnico. Kljub velikim površinam, ki jih na Goriškem pokrivajo visokodebelni sadovnjaki, je pogorelček tu redek gnezdilec, ki se pojavlja raztreseno po vsem območju.	

Šmarnica *Phoenicurus ochruros*



Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	2170 - 2430 parov
Vrsta zabeležena v:	44 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	5,0 ± 0,3 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	120000 - 175000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	1,6
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	101
Št. prešteti parov Goričko 2012:	117
Maksimalno parov na transektih 2012:	7
Povprečno parov na transektih 2012:	1,98
Indeks popis 2012 / NOAGS:	115,7
Šmarnica kot sekundarni habitat namesto skalnih sten visokogorja uporablja zgradbe. Gnezdo si zneša na tramovih, v luknjah ali na policah. Samec rad poje na slemenih stavb, prične pa že v jutranji temi. Šmarnica se hrani z nevretenčarji, ki jih nabira na vrtovih, tratah in dvoriščih. Na Goriškem je pogosta in splošno razširjena gnezdilka naselij.	


Repaljščica *Saxicola rubetra*



Vir podatkov za grafični prikaz:	tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste NOAGS (2003-2014), popis 2012
Gnezditveni status:	G?
Ocena populacije v KPG:	0 - 5 parov
Vrsta zabeležena v:	2 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	600 - 1100 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	0,3
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	da
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	E2
Rdeči seznam (osnutek):	EN
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	5
Št. prešteti parov Goričko 2012:	3
Maksimalno parov na transektih 2012:	2
Povprečno parov na transektih 2012:	0,05
Indeks popis 2012 / NOAGS:	59,3
Repaljščica potrebuje pozno košene, praviloma vlažne travnike s posameznimi višjimi steblikami. Te uporablja kot preže in pevska mesta. Gnezdo si splete na tleh v zavetju trave. Hrani se z nevretenčarji, ki jih lovi na travniku. Gnezditve repaljščice na Goriškem sicer ni bila potrjena, a glede na dolgotrajno zadrževanje posameznih parov v času gnezditve domnevamo, da na območju	


verjetno gnezdi. Je maloštevilna, pojavlja se na vlažnih travnikih v dolinah, v Markovcih pa je bil par opazovan na nekošenem suhem pobočnem travniku.

Prosnik *Saxicola torquatus*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	1350 - 1570 parov
Vrsta zabeležena v:	45 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	3,2 ± 0,2 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	32000 - 59000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	3,2
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	da
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	111
Št. prešteti parov Goričko 2012:	87
Maksimalno parov na transektih 2012:	6
Povprečno parov na transektih 2012:	1,47
Indeks popis 2012 / NOAGS:	78,2
Prosnik najraje zaseda suhe, odprte in osončene površine, velikokrat tudi ruderalne. Gnezdi ob robovih jarkov, poljskih poti in njiv, v pasu višje trave. Samci pogosto pojejo z grma. Na Goričkem je še pogost in splošno razširjen gnezdilec, vendar v primerjavi s številčnostjo v času popisov NOAGS njegova populacija zadnja leta očitno upada.	

Cikovt *Turdus philomelos*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	3000 - 3320 parov
Vrsta zabeležena v:	57 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	$6,8 \pm 0,3$ parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	100000 - 160000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	2,4
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	II/2
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	147
Št. prešteti parov Goričko 2012:	321
Maksimalno parov na transektih 2012:	15
Povprečno parov na transektih 2012:	5,44
Indeks popis 2012 / NOAGS:	218,9
Cikovt je gozdna vrsta ptice, ki pa se velikokrat hrani na bližnjih travnikih. Gnezdo je nameščeno v rogovilo in znotraj lepo zglajeno z blatom. Hrani se z različnimi plodovi in nevretenčarji, med drugim tudi s polži s hišico. Te razbija na posebnem kamnu – nakovalu, okoli katerega lahko najdemo vse polno praznih hišic. Na Goriškem je pogost in splošno razširjen gnezdec gozdov.	

Carar *Turdus viscivorus*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	640 - 790 parov
Vrsta zabeležena v:	37 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	1,5 ± 0,2 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	35000 - 55000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	1,6
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	II/2
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	66
Št. prešteti parov Goričko 2012:	64
Maksimalno parov na transektih 2012:	5
Povprečno parov na transektih 2012:	1,08
Indeks popis 2012 / NOAGS:	97,3
Carar naseljuje gozdove z jasami v bližini kmetijske kulturne krajine. Zelo pomembno vlogo igra pri raznašanju semen bele omele med drevesi, saj se pozimi rad hrani z njenimi plodovi. Ko se iztrebi na vejah, se jih lepljiva, neprebavljena semena oprimejo in vzkalijo v novo belo omele. Na Goriškem je relativno pogost gnezdilec, posebno v vzhodnem delu.	

Kos *Turdus merula*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	5720 - 6150 parov
Vrsta zabeležena v:	59 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	12,8 ± 0,5 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	410000 - 580000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	1,2
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	II/2
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	278
Št. prešteti parov Goričko 2012:	360
Maksimalno parov na transektih 2012:	20
Povprečno parov na transektih 2012:	6,10
Indeks popis 2012 / NOAGS:	129,4
Kos glede habitata ni izbirčen; v osnovi je sicer gozdna ptica, a naseljuje tudi vrtove in kmetijske površine z več grmovja. Hrani se z nevretenčarji, ki jih nabira v gozdu, na travnikih ali na gozdnih robovih, ter z različnimi plodovi. Na Goričkem je zelo pogost in splošno razširjen gnezdilec.	

Pisana penica *Sylvia nisoria*




Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2010-2013), popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	20 - 40 parov
Vrsta zabeležena v:	7 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	850 - 1400 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	2,7
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	V
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	I
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	14
Maksimalno parov na transektih 2012:	6
Povprečno parov na transektih 2012:	0,24
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Pisana penica prebiva v odprti krajini, porasli z grmovjem, in na pašnikih. Večkrat jo opazimo na istem kraju kot rjavega srakoperja, s katerim sta v posebnem odnosu. Znanstveniki so namreč ugotovili, da sta skupaj uspešnejša v odvrčanju plenilcev. Gnezdo si splete v grmovju. Hrani se z nevretenčarji, jeseni pa tudi s plodovi. Na Goričkem je redka gnezdilka grmišč vzhodnega dela, kjer se je verjetno naselila šele v zadnjem desetletju, saj je v času popisov za NOAGS nismo zabeležili.	

Črnohlavka *Sylvia atricapilla*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	15760 - 16470 parov
Vrsta zabeležena v:	59 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	34,8 ± 0,8 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	620000 - 850000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	2,2
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	506
Št. prešteti parov Goričko 2012:	1010
Maksimalno parov na transektih 2012:	32
Povprečno parov na transektih 2012:	17,12
Indeks popis 2012 / NOAGS:	199,7
Habitat črnohlavke so različna grmišča in gozdni rob. Hrani se z nevretenčarji, jeseni pa tudi z različnimi plodovi (robide, kalina, krhlika). Črnohlavka je bila zabeležena na vseh transektih popisa in je najštevilčnejša vrsta ptice na Goriškem hkrati.	

Rjava penica *Sylvia communis*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	1440 - 1660 parov
Vrsta zabeležena v:	35 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	$3,3 \pm 0,2$ parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	25000 - 35000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	5,2
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	da
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	V
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	46
Št. prešteti parov Goričko 2012:	72
Maksimalno parov na transektih 2012:	5
Povprečno parov na transektih 2012:	1,22
Indeks popis 2012 / NOAGS:	158,2
Rjava penica je vrsta mejic in grmovja. Ustrezajo ji zgodnje sukcesijske faze gozda, v zaprtem gozdu je ni. Raje ima suhe in toplejše lege. Hrani se z nevretenčarji, jeseni tudi plodovi. Velik porast na Goričkem v zadnjih letih kaže na zaraščajočo se kulturno krajino. Je precej pogosta gnezdilka s tremi izrazitimi zgostitvami v okolici Rogaševcev, Domanjševcev in Motvarjevcev.	

Mlinarček *Sylvia curruca*




Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2010-2014), popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	20 - 30 parov
Vrsta zabeležena v:	6 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	5000 - 10500 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	0,3
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	6
Maksimalno parov na transektih 2012:	1
Povprečno parov na transektih 2012:	0,10
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Prebiva v odprti krajini z večjimi skupinami grmovja in mejicami, pogosto tudi v bližini hiš. Rad gnezdi v iglavcih. V Sloveniji je bil pred tridesetimi leti znan predvsem iz visokogorja (iglasti gozdovi in pas ruševja), vendar pa je sčasoma naselil tudi nižinske predele (Geister 1995). Na Goričkem je mlinarček redek gnezdič, ki se pojavlja raztreseno po vsem območju.	

Bičja trstnica *Acrocephalus schoenobaenus*




Vir podatkov za grafični prikaz:	tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste NOAGS (2001-2014), Božič (2000)
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	30 - 50 parov
Vrsta zabeležena v:	0 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	700 - 1200 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	4,2
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	V
Rdeči seznam (osnutek):	NT
Dodatek Direktive o pticah:	- (kvalifikacijska vrsta za Goričko)
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	5
Št. prešteti parov Goričko 2012:	0
Maksimalno parov na transektih 2012:	-
Povprečno parov na transektih 2012:	-
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Bičja trstnica prebiva na pozno košenih, rahlo zaraščajočih se travnikih s šašjem, visokimi steblikami in posameznimi grmički. Prehranjuje se z majhnimi nevretenčarji. Na Goriškem je redka gnezdilka; ustrezajo ji predvsem vlažni travniki severno od Ledavskega jezera. Tam je bila zabeležena že leta 1999, in sicer kar 33 pojočih samcev (Božič 2000).	

Kobiličar *Locustella naevia*




Vir podatkov za grafični prikaz:	tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste NOAGS (2003-2011)
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	10 - 15 parov
Vrsta zabeležena v:	0 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	150 - 300 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	5,6
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	E2
Rdeči seznam (osnutek):	NT
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	2
Št. prešteti parov Goričko 2012:	0
Maksimalno parov na transektih 2012:	-
Povprečno parov na transektih 2012:	-
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Kobiličarjev habitat je ekstenziven, lahko tudi zaraščajoč travnik z nekoliko višjimi steblikami in posameznimi grmički. Gnezdi na tleh ali nizko v grmu. Prehranjuje se z žuželkami. Ime je dobil zaradi podobnosti svojega petja cvrčanju kobilic. Kobiličar je na Goriškem redek gnezdilec, katerega večina populacije gnezdi ob Ledavskem jezeru.	

Rečni cvrčalec *Locustella fluviatilis*




Vir podatkov za grafični prikaz:	tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste NOAGS (2003-2014), popis 2012, Vrezec (2004b)
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	50 - 70 parov
Vrsta zabeležena v:	4 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	1500 - 2500 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	3,0
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	V
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	5
Št. prešteti parov Goričko 2012:	13
Maksimalno parov na transektih 2012:	6
Povprečno parov na transektih 2012:	0,22
Indeks popis 2012 / NOAGS:	257,1
Rečni cvrčalec prebiva na ekstenzivnih, zaraščajočih se površinah, zlasti travnikih, lahko pa tudi v lokah z bogatim zeliščnim slojem. Samec pogosto poje ponoči. Na Goričkem je lokalno pogost in številan, predvsem na jugovzhodnem delu. Tam mu ustreza zadosti visoka in gosta trava, ki jo najde predvsem v manjših zamočvirjenih dolinah.	

Trstni cvrčalec *Locustella luscinioides*




Vir podatkov za grafični prikaz:	tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste NOAGS (2001-2014), Božič (2000)
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	10 - 15 parov
Vrsta zabeležena v:	0 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	100 - 200 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	8,3
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	E2
Rdeči seznam (osnutek):	NT
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	3
Št. prešteti parov Goričko 2012:	0
Maksimalno parov na transektih 2012:	-
Povprečno parov na transektih 2012:	-
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Trstni cvrčalec gnezdi v trstiščih na Ledavskem jezeru, poleg tega pa tudi na močvirnih travnikih severno od jezera, v sestoji visokega šašja, ki zanj sicer ni značilen habitat (Božič 2000). Samca najlažje opazujemo med petjem z vrha trstne steblike. Prehranjuje se z nevretenčarji, gnezdi pa nizko v trstičju na plasti odmrlih steblik.	

Srpična trstnica *Acrocephalus scirpaceus*




Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2010-2014)
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	3 - 5 parov
Vrsta zabeležena v:	0 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	200 - 300 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	1,6
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	E2
Rdeči seznam (osnutek):	NT
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	0
Maksimalno parov na transektih 2012:	-
Povprečno parov na transektih 2012:	-
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Gnezdo srpične trstnice je skodelasto in pripeto na trstna stebila. Hrani se z nevretenčarji, ki jih nabira v trstiščih. Zaradi ostrih robov na trstnih listih imata starša ob koncu gnezditvene sezone povsem obrabljeno perje. Na Goriškem gnezdi v trstiščih na Ledavskem jezeru ter pri Kobilju.	

Močvirska trstnica *Acrocephalus palustris*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	800 - 1200 parov
Vrsta zabeležena v:	15 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	$4,0 \pm 0,3$ parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	10000 - 15000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	8,0
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	da
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	44
Št. prešteti parov Goričko 2012:	48
Maksimalno parov na transektih 2012:	8
Povprečno parov na transektih 2012:	0,81
Indeks popis 2012 / NOAGS:	109,5
Močvirska trstnica gnezdi v visokih in gostih steblikah ob njivskih površinah in jarkih. Gnezdo je skodelasto in pripeto ob vsaj tri močnejša stebela (pogosto zlate rozge). Samci izjemno dobro oponašajo petje drugih vrst, ki ga vgradijo v svojo pesem. Na Goričkem je najštevilnejša na skrajnem severovzhodu v dolini Krke.	

Rakar *Acrocephalus arundinaceus*




Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2004-2014), Vrezec (2004a)
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	25 - 35 parov
Vrsta zabeležena v:	0 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	250 - 350 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	10,0
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	E2
Rdeči seznam (osnutek):	NT
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	0
Maksimalno parov na transektih 2012:	-
Povprečno parov na transektih 2012:	-
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Rakar prebiva v trstičih, lahko tudi manjših. Najlaže ga vidimo v času svatovanja, saj takrat samci splezajo na vrh trsta in pojejo. Gnezdo je skodelaste oblike, pripeto na nekaj trstnih stebel. Rakar se prehranjuje z drobnimi nevretenčarji, ki jih obira s stebel trsta in drugih rastlin. Na Goričkem je najpogostejši na Ledavskem jezeru, drugod pa zaradi pomanjkanja primerne gnezditvenega habitata redek. Vrezec (2004a) je maja 2004 na Hodoškem jezeru našel tri pojoče samce.	

Grmovščica *Phylloscopus sibilatrix*




Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2010-2014), popis 2012
Gnezditveni status:	G?
Ocena populacije v KPG:	0 - 5 parov
Vrsta zabeležena v:	11 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	2000 - 4000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	0,1
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	SPEC 2
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	13
Maksimalno parov na transektih 2012:	2
Povprečno parov na transektih 2012:	0,22
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Grmovščica je vrsta zrelih, senčnih gozdov, predvsem bukovih. Hrani se z nevretenčarji. Na popisu smo jo sicer zabeležili v gnezditvenem obdobju, vendar je zaradi njene navade, da poje tudi na selitvi, težko oceniti, ali na Goričkem dejansko gnezdi.	

Vrbji kovaček *Phylloscopus collybita*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	3070 - 3390 parov
Vrsta zabeležena v:	56 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	7,0 ± 0,3 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	160000 - 200000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	1,8
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	223
Št. prešteti parov Goričko 2012:	240
Maksimalno parov na transektih 2012:	11
Povprečno parov na transektih 2012:	4,07
Indeks popis 2012 / NOAGS:	107,9
Vrbji kovaček je pogosta gozdna vrsta. Gnezdo je skrito v gostem rastju blizu tal, na primer v robidah ali koprivah. Prehranjuje se z drobnimi nevretenčarji. Na Goriškem je njegov center razširjenosti v osrednjem in severovzhodnem delu območja.	

Rumenoglavi kraljiček *Regulus regulus*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	1050 - 1240 parov
Vrsta zabeležena v:	11 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	2,5 ± 0,2 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	80000 - 175000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	0,9
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	57
Št. prešteti parov Goričko 2012:	24
Maksimalno parov na transektih 2012:	5
Povprečno parov na transektih 2012:	0,41
Indeks popis 2012 / NOAGS:	41,9
Rumenoglavi kraljiček je vrsta iglastega gozda. Skupaj z rdečeglavi kraljičkom sta najlažji evropski vrsti, saj odrasli osebki tehtajo zgolj 5-7 gramov. Gnezdo je na iglavcih, zgrajeno iz mahov, vejic, pajčevin in lišajev, notri postlano s perjem in dlakami. Hrani se z drobnimi nevretenčarji, na primer listnimi ušmi in pajki. Na Goriškem je pogost predvsem v gozdovih med Mačkovci in Šulinci.	

Rdečeglavi kraljiček *Regulus ignicapilla*




Vir podatkov za grafični prikaz:	tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste NOAGS (2003-2012), popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	150 - 300 parov
Vrsta zabeležena v:	4 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	56000 - 125000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	0,2
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	10
Št. prešteti parov Goričko 2012:	8
Maksimalno parov na transektih 2012:	3
Povprečno parov na transektih 2012:	0,14
Indeks popis 2012 / NOAGS:	79,1
Tudi rdečeglavi kraljiček prebiva v iglastem gozdu, a je na Goriškem precej redkejši od rumenoglavega kraljička. Pozimi se obe vrsti kraljičkov radi pridružita mešanim siničjim jatam, ki se klatijo naokoli, iščejo hrano. Gnezdo je grajeno enako kot pri rumenoglavem kraljičku, podobna je tudi prehrana.	

Stržek *Troglodytes troglodytes*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	390 - 580 parov
Vrsta zabeležena v:	19 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	85000 - 115000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	0,5
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	44
Št. prešteti parov Goričko 2012:	26
Maksimalno parov na transektih 2012:	3
Povprečno parov na transektih 2012:	0,44
Indeks popis 2012 / NOAGS:	59,3
Stržek gnezdi predvsem v senčnejših listnatih gozdovih z vlažnejšo podlago. Gnezdo je krogla iz mahu, nameščena v špranji med kamenjem ali med drevesnimi koreninami. Samci imajo pogosto mladiče z več samicami hkrati. Hrani se z žuželkami in pajkovci, ki jih najde med stikanjem po špranjah. V mrzlih nočeh se več stržkov stisne v staro gnezdo ali kakšno pred mrazom zavarovano luknjo. Stržek je na Goriškem pogost in splošno razširjen gnezdec gozdov.	

Sivi muhar *Muscicapa striata*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	850 - 1020 parov
Vrsta zabeležena v:	19 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	2,0 ± 0,2 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	25000 - 42000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	2,8
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	SPEC 3
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	19
Št. prešteti parov Goričko 2012:	26
Maksimalno parov na transektih 2012:	2
Povprečno parov na transektih 2012:	0,44
Indeks popis 2012 / NOAGS:	140,2
Sivi muhar gnezdi v gozdu in naseljih. Gnezdo si spleta v polduplih, različnih luknjah (npr. v zidu), pogosto pa tudi na nenavadnih mestih, na primer v cvetličnih lončkih. Prehranjuje se predvsem z letečimi žuželkami, ki jih lovi med poletavanjem s preže. Na Goriškem naseljuje kulturno krajino v bližini človeških bivališč.	

Belovrati muhar *Ficedula albicollis*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	200 - 400 parov
Vrsta zabeležena v:	9 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	8500 - 12000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	2,9
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	V
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	I
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	8
Št. prešteti parov Goričko 2012:	20
Maksimalno parov na transektih 2012:	9
Povprečno parov na transektih 2012:	0,34
Indeks popis 2012 / NOAGS:	237,3
Belovrat muhar je vrsta odraslega listnatega gozda z večjim deležem odmrlega in odmirajočega drevja. V Sloveniji dosega najvišje gostote v poplavnem gozdu ob Muri in v Krakovskem gozdu. Gnezdi v duplih in se prehranjuje z žuželkami, za katerimi poletava s preže. Na Goriškem ga najdemo predvsem na jugovzhodu v obsežnih gozdovih okoli Bukovniškega jezera.	

Velika sinica *Parus major*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	12680 - 13320 parov
Vrsta zabeležena v:	59 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	28,1 ± 0,7 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	500000 - 700000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	2,2
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	499
Št. prešteti parov Goričko 2012:	661
Maksimalno parov na transektih 2012:	29
Povprečno parov na transektih 2012:	11,20
Indeks popis 2012 / NOAGS:	132,5
Velika sinica pri izbiri življenjskega okolja ni preveč izbirljiva, saj prebiva v gozdovih, parkih, visokodebelnih sadovnjakih in naseljih. Gnezdi v duplih, rada sprejme tudi gnezdilnice. Nekateri pari pa si za gnezdenje izberejo dokaj nenavadna mesta. Na Goričkem smo njeno gnezdo našli v poštnem nabiralniku in okrasni lončeni amfori na vrtu stanovanjske hiše. V času gnezdenja en par mladičem prinese na stotine gosenc, ki bi sicer delale škodo na sadnem drevju. Na Goričkem je zelo pogosta in splošno razširjena vrsta.	

Menišček *Periparus ater*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	340 - 510 parov
Vrsta zabeležena v:	16 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	350000 - 480000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	0,1
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	40
Št. prešteti parov Goričko 2012:	23
Maksimalno parov na transektih 2012:	5
Povprečno parov na transektih 2012:	0,39
Indeks popis 2012 / NOAGS:	56,9
Menišček je pogost v iglastih in mešanih gozdovih, kjer gnezdi v nizkih duplih, špranjah med kamenjem in v talnih luknjah. Je najmanjša evropska sinica. Hrani se z drobnimi nevretenčarji in različnimi semeni (žir, smrekova, macesnova, jelševa in brezova semena). Na Goričkem je pogost predvsem v gozdovih okoli Mačkovcev ter med Šalovci in Dolenci.	

Plavček *Cyanistes caeruleus*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	4760 - 5150 parov
Vrsta zabeležena v:	55 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	10,7 ± 0,4 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	120000 - 340000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	2,2
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	126
Št. prešteti parov Goričko 2012:	203
Maksimalno parov na transektih 2012:	12
Povprečno parov na transektih 2012:	3,44
Indeks popis 2012 / NOAGS:	160,6
Plavček gnezdi v duplih, rad pa zasede tudi gnezdilnice. Najpogostejši je v odraslih hrastovih gozdovih. Večino prehrane v gnezditvenem času sestavljajo gosenice metuljev (npr. različnih zavijačev, ki so škodljivci na sadnem drevju) in listne uši. Pozimi se v mešanih jatah z drugimi sinicami klati naokoli in obiskuje tudi krmilnice. Na Goriškem je pogosta in splošno razširjena vrsta.	

Čopasta sinica *Lophophanes cristatus*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	300 - 400 parov
Vrsta zabeležena v:	18 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	90000 - 280000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	0,2
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	SPEC 2
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	29
Št. prešteti parov Goričko 2012:	29
Maksimalno parov na transektih 2012:	6
Povprečno parov na transektih 2012:	0,49
Indeks popis 2012 / NOAGS:	101,2
Čopasta sinica je vrsta iglastega in mešanega gozda. Gnezdi v duplih v odmirajočem drevju, ki si jih pogosto izoblikuje sama. Hrani se z žuželkami, njihovimi ličinkami in semeni. Na Goriškem je njeno središče razširjenosti na severu, v sestojih rdečega bora.	

Močvirska sinica *Poecile palustris*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	1960 - 2210 parov
Vrsta zabeležena v:	36 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	4,5 ± 0,3 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	130000 - 250000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	1,1
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	SPEC 3
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	98
Št. prešteti parov Goričko 2012:	72
Maksimalno parov na transektih 2012:	5
Povprečno parov na transektih 2012:	1,22
Indeks popis 2012 / NOAGS:	73,6
Močvirska sinica je gnezdilka gozdov. Večino leta se zadržuje na svojem teritoriju ali v njegovi neposredni bližini. Gnezdi v duplih. Hrani se z gosencami, pajki in semeni, ki jih išče v bogati podrasti ali na tleh (npr. žir). Na Goriškem je pogosta gozdna vrsta, s centrom razširjenosti na jugovzhodu v obsežnih gozdovih okoli Bukovniškega jezera.	

Dolgorepka *Aegithalos caudatus*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	590 - 730 parov
Vrsta zabeležena v:	21 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	1,4 ± 0,2 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	20000 - 25000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	2,9
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	40
Št. prešteti parov Goričko 2012:	32
Maksimalno parov na transektih 2012:	3
Povprečno parov na transektih 2012:	0,54
Indeks popis 2012 / NOAGS:	79,1
Dolgorepka je vrsta gozda in gozdnega roba z obiljem podrasti. Prehranjuje se z manjšimi žuželkami, npr. listnimi ušmi. Gnezdo pripne v rogovilo grma, zgrajeno pa je iz mahu, pajčevin, perja in zunaj obdano s kosmi lišajev, da se zlije z okolico. Znano je, da ima gnezdeči par ob sebi pogosto pomočnike, ki pomagajo hraniti mladiče. Ti so praviloma sorodniki samca, ki jim je gnezdittev spodletela. Zunaj gnezditvenega časa tvori večje jate, ki se potem klatijo naokoli in iščejo hrano. Na Goričkem je pogosta predvsem med Rogašovci in Sotino ter v okolici Fokovcev.	

Plašica *Remiz pendulinus*




Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2014)
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	3 - 5 parov
Vrsta zabeležena v:	0 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	
Ocena populacije v Sloveniji:	100 - 300 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	2,0
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	V
Rdeči seznam (osnutek):	NT
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	3
Št. prešteti parov Goričko 2012:	0
Maksimalno parov na transektih 2012:	-
Povprečno parov na transektih 2012:	-
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Plašica gnezdi v vrbovju ob rekah in jezerih. Mošnjasto gnezdo z vhodom v obliki kratkega tunela pripne na vejo, pogosto nad vodo. Prehranjuje se z ličinkami žuželk in pajki, ki jih nabira v trstičih in grmovju. Na Goriškem je zelo redka gnezdilka sestojev bele vrbe ob Ledavskem jezeru.	

Brglez *Sitta europaea*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	3410 - 3750 parov
Vrsta zabeležena v:	50 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	7,7 ± 0,4 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	100000 - 200000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	2,4
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	93
Št. prešteti parov Goričko 2012:	140
Maksimalno parov na transektih 2012:	12
Povprečno parov na transektih 2012:	2,37
Indeks popis 2012 / NOAGS:	151,0
Brglez je gnezdec listnatih in mešanih gozdov, parkov ter visokodebelnih sadovnjakov. Prevelik vhod v duplo ali gnezdilnico si spretno obzida z blatom, da poveča varnost svojega zaroda. Je edina evropska ptica, ki zmore plezati z glavo navzdol. Jeseni v različne špranje in luknje zatika semena in si tako pripravi zalogo za zimo. Na Goriškem je pogosta in splošno razširjena vrsta z izrazito zgostitvijo v gozdovih okoli Bukovniškega jezera.	

Dolgoprsti plezalček *Certhia familiaris*



Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	300 - 400 parov
Vrsta zabeležena v:	17 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	50000 - 100000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	0,5
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	10
Št. prešteti parov Goričko 2012:	21
Maksimalno parov na transektih 2012:	4
Povprečno parov na transektih 2012:	0,36
Indeks popis 2012 / NOAGS:	207,6
Dolgoprsti plezalček je v Sloveniji najbolj pogost v mešanih ali iglastih gozdovih v nekoliko višjih legah. Gnezdi v špranjah za odstopljenim lubjem, v globokih razpokah v deblu in luknjah v zidovih. Prehranjuje se pretežno s pajkovci in žuželkami ter njihovimi ličinkami, ki jih s tankim kljunom pobira iz hrapavega lubja. Od sorodnega kratkoprstega plezalčka ga najlaže ločimo po petju. Na Goriškem je njegova populacija izrazito zgoščena na skrajnem severovzhodu območja med Hodošem in Dolenci.	


Kratkoprsti plezalček *Certhia brachydactyla*



Vir podatkov za grafični prikaz:	tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste NOAGS (2003-2012), popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	400 - 600 parov
Vrsta zabeležena v:	13 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	50000 - 100000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	0,7
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	32
Št. prešteti parov Goričko 2012:	14
Maksimalno parov na transektih 2012:	2
Povprečno parov na transektih 2012:	0,24
Indeks popis 2012 / NOAGS:	43,7
Kratkoprsti plezalček dosega najvišje gostote v starih hrastovih gozdovih, med iglavci pa mu je najljubši rdeči bor. Gnezditna špranja za odstopljenim lubjem je pogosto tako tesna, da se valeča ptica v njej ne more niti obrniti. Prehrano sestavljajo pretežno pajkovci ter žuželke in njihove razvojne oblike. Pozimi prenočuje v skupinah od nekaj do 20 osebkov, ki se stiskajo drug k	


drugemu, največkrat z glavami skupaj in repi navzven, tako da s telesi tvorijo obliko zvezde. Na Goričkem je dokaj pogost v gozdovih po vsem območju.

Rjavi srakoper *Lanius collurio*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	500 - 1000 parov
Vrsta zabeležena v:	47 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	7,6 ± 0,4 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	20000 - 30000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	3,0
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	da
Status SPEC:	SPEC 3
Rdeči seznam:	V1
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	I (kvalifikacijska vrsta za Goričko)
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	94
Št. prešteti parov Goričko 2012:	136
Maksimalno parov na transektih 2012:	7
Povprečno parov na transektih 2012:	2,31
Indeks popis 2012 / NOAGS:	144,1
Rjavi srakoper se k nam vrne konec aprila. Gnezdi v odprti krajini z mozaikom košenih in nekošenih travnikov, v kateri ne smejo manjkati posamezni grmički, najbolj trnasti (šipek, glog). V njih si namreč spletajo gnezdo. Prehranjuje se z žuželkami, ki jih ulovi s preže – to so lahko grmički, veje, ograje ali žice. Presežek hrane nabode na trne kot rezervo za deževne dni. Na Goriškem je rjavi srakoper dokaj pogost gnezdilec mozaične krajine z grmišči in travniki. Videti je, da njegova populacija v zadnjih letih narašča, kar je morda posledica zaraščanja krajine.	

Sraka *Pica pica*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	250 - 350 parov
Vrsta zabeležena v:	13 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	9000 - 14500 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	2,6
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	II/2
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	44
Št. prešteti parov Goričko 2012:	22
Maksimalno parov na transektih 2012:	3
Povprečno parov na transektih 2012:	0,37
Indeks popis 2012 / NOAGS:	50,2
Sraka si gnezdo, ki se ga po krivici drži sloves neurejenosti, najraje splete v tankih vejah grmičevja, kamor različni plenilci zaradi krhkosti vejic težko dostopajo. Gnezdo je kroglasto z vhodom s strani, njegova notranjost pa je zglajena s koreninicami. Sraka se prehranjuje z rastlinsko in živalsko hrano, včasih upleni tudi mladiče ptic pevk. Značilna zanjo so skupinska prenočišča, na katerih se zbere tudi po več deset osebkov. Na Goričkem je pogostejša le na skrajnem severovzhodu med Rogašovci in Kuzmo ter na jugozahodu v okolici Cankove.	

Šoja *Garrulus glandarius*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	1770 - 2010 parov
Vrsta zabeležena v:	53 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	4,1 ± 0,3 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	20000 - 30000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	7,6
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	II/2
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	76
Št. prešteti parov Goričko 2012:	126
Maksimalno parov na transektih 2012:	7
Povprečno parov na transektih 2012:	2,14
Indeks popis 2012 / NOAGS:	166,1
Šoja je gnezdilka gozdov, zlasti hrastovih, saj želod sestavlja pomemben del njene jesenske prehrane. Zimsko zalogo hrane si pripravlja tako, da semena in plodove skriva v zemljo. Na marsikatero zalogo nato pozabi, zato ima pomembno vlogo pri raznašanju in zasajanju hrasta. Na Goričkem je pogosta gnezdilka, predvsem na vzhodnem delu območja.	

Kavka *Corvus monedula*




Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2010-2014), popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	100 - 200 parov
Vrsta zabeležena v:	5 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	650 - 700 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	22,2
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	V / E1 (naravna gnezdišča)
Rdeči seznam (osnutek):	NT
Dodatek Direktive o pticah:	II/2
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	12
Maksimalno parov na transektih 2012:	7
Povprečno parov na transektih 2012:	0,20
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
V Sloveniji se kavka pojavlja predvsem po mestih in vaseh, kjer gnezdi v dimnikih, prezračevalnih jaških in na podstrešjih. Na Goriškem jo še najdemo v naravnih gnezdiščih - opuščenih duplih črne žolne (Štumberger 2003b). Kjer ima možnost, gnezdi kolonijsko in je tudi sicer zelo družabna ptica. Hrani se na tleh, kjer pobira semena, plodove in nevretenčarje, občasno tudi organske odpadke in mrhovino.	

Črna vrana *Corvus corone*




Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2010), popis 2012
Gnezditveni status:	G?
Ocena populacije v KPG:	0 - 3 parov
Vrsta zabeležena v:	1 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	30 - 50 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	3,8
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	R
Rdeči seznam (osnutek):	VU
Dodatek Direktive o pticah:	II/2
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	1
Maksimalno parov na transektih 2012:	1
Povprečno parov na transektih 2012:	0,02
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Črna vrana je v Sloveniji precej redkejša od sorodne sive vrane. Prehranjuje se s semeni, plodovi, nevretenčarji, organskimi odpadki, mrhovino, pleni pa lahko tudi manjše vretenčarje in njihove mladiče. Gnezdo je spleteno iz vej in najpogosteje nameščeno visoko na drevesu. Na Goričkem je bila opazovana v gnezditvenem času, zabeleženi pa so bili tudi križanci s sivo vrano, tako da je morebitno gnezdenje verjetno v mešanih parih.	

Siva vrana *Corvus cornix*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	1500 - 2000 parov
Vrsta zabeležena v:	58 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	7,1 ± 0,3 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	40000 - 82000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	2,9
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	II/2
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	184
Št. prešteti parov Goričko 2012:	285
Maksimalno parov na transektih 2012:	15
Povprečno parov na transektih 2012:	4,83
Indeks popis 2012 / NOAGS:	155,1
Siva vrana je najpogostejša predstavnik družine vran v Sloveniji. Biva v odprti kmetijski krajini. Pogosto se hrani na sveže pokošenih travnikih ali sveže zoranih njivah, kjer pobira od kosilnice poškodovane nevretenčarje oziroma ličinke žuželk, ki jih je na svetlobo zanesel plug. Do svojih mladičev je zelo zaščitniška, zato v obdobju, ko še ne znajo dobro leteti, z vrtočlavi navidezni napadi zastrašuje tudi precej večja bitja, kot je sama. Sive vrane so izjemno bistre ptice, kar je verjetno posledica njihove družabnosti. Na Goričkem je dokaj pogosta gnezdilka, z izrazito gostoto na zahodnem delu med Rogašovci in Sotino.	

Krokar *Corvus corax*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	80 - 130 parov
Vrsta zabeležena v:	19 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	2000 - 3500 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	3,8
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	23
Maksimalno parov na transektih 2012:	2
Povprečno parov na transektih 2012:	0,39
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Krokar je največji predstavnik družine vran, ki kljub ne prav spevnemu petju sodijo med pevce. Gnezdo si zgradi na polici v skalni steni ali na visokem drevju. Pri hrani je oportunist, ki se ne brani niti mrhovine in organskih odpadkov. Kot vse vrane so tudi krokarji izjemno inteligentni in se pogosto družijo v jate, zlasti mladi osebki. Par praviloma ostane skupaj vse življenje. Na Goriškem ni zelo pogost gnezdec, a se pojavlja raztreseno po vsem območju.	

Škorec *Sturnus vulgaris*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	5000 - 6000 parov
Vrsta zabeležena v:	51 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	24,2 ± 0,6 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	180000 - 350000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	2,1
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	da
Status SPEC:	SPEC 3
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	II/2
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	516
Št. prešteti parov Goričko 2012:	609
Maksimalno parov na transektih 2012:	29
Povprečno parov na transektih 2012:	10,32
Indeks popis 2012 / NOAGS:	118,1
Škorci gnezdiijo v naravnih duplih, gnezdilnicah in celo v luknjah v stenah hiš. V dobrih razmerah lahko tvorijo ohlapne kolonije, katerih člani se pogosto hranijo na istih površinah. Mladiče hranijo večinoma z nevretenčarji (žuželke, deževniki, pajkovci), prinašajo pa jim tudi zrele sadeže, na primer češnje. So izjemno družabne ptice, ki na jesen tvorijo več tisočglave ali celo deset tisočglave jate. Te prenočujejo na skupinskih prenočiščih v trstičju ali grmovju, tudi na Ledavskem jezeru (Denac 2002). Na Goričkem je škorec pogosta in splošno razširjena vrsta, s pozornost zbujajočimi gostotami v okolici Rogašovcev ter med Sebeborci in Fokovci.	

Kobilar *Oriolus oriolus*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	1260 - 1470 parov
Vrsta zabeležena v:	58 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	$3,0 \pm 0,2$ parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	24000 - 34000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	4,7
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	138
Št. prešteti parov Goričko 2012:	217
Maksimalno parov na transektih 2012:	9
Povprečno parov na transektih 2012:	3,68
Indeks popis 2012 / NOAGS:	157,0
Kobilar je kljub svoji živo rumeni barvi presenetljivo neopazna ptica, saj večino časa preživi v krošnjah listavcev. Pogosteje kot s svojo pojavo se izda z melodičnim petjem. Vendar pozor! Kobilar se v naše kraje vrne šele konec aprila, tako da so vsi »kobilarji« pred tem v resnici škorci, ki odlično oponašajo njegovo petje. Kobilar gnezdi na listnatem drevju, v razcepu veje. Na Goriškem je dokaj pogost gnezdilec, z izrazitimi gostotami na vzhodnem delu območja.	

Domači vrabec *Passer domesticus*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	4500 - 4890 parov
Vrsta zabeležena v:	30 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	10,2 ± 0,4 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	300000 - 465000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	1,2
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	SPEC 3
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	187
Št. prešteti parov Goričko 2012:	182
Maksimalno parov na transektih 2012:	26
Povprečno parov na transektih 2012:	3,08
Indeks popis 2012 / NOAGS:	97,3
Čeprav sodi med pevce, ni napev domačega vrabca nič posebnega. Sestavlja ga dolgo zaporedje enostavnih »čriv-čriv«, ki jih samci prepevajo pod napušči, v žlebovih in na strehah hiš. Domači vrabec je namreč tesno povezan s človekovimi bivališči, kjer najde tako gnezdišča kot hrano. Zelo mu ustrezajo netlakovana dvorišča, kjer rastejo različne rastline, ki obrodijo številna majhna semena (na primer ptičja dresen). V času gnezditve pa mladičem prinaša predvsem žuželke. Na Goričkem je pogost predvsem v naseljih na zahodnem delu območja.	

Poljski vrabec *Passer montanus*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	4500 - 5000 parov
Vrsta zabeležena v:	51 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	20,2 ± 0,6 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	180000 - 290000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	2,0
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	da
Status SPEC:	SPEC 3
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	388
Št. prešteti parov Goričko 2012:	328
Maksimalno parov na transektih 2012:	21
Povprečno parov na transektih 2012:	5,56
Indeks popis 2012 / NOAGS:	84,6
Poljski vrabci gnezdiijo v duplih, radi pa zasedejo tudi gnezdilnice. Pozimi si te luknje obilno obložijo s slamo in kurjim perjem, da jih grejeta med prenočevanjem. Pogosti so v vaseh, kjer ljudje še redijo krave, konje, drobnico ali kokoši, saj so s tem povezane višje gostote nekaterih žuželk in raztresenega zrnja. So zelo družabni in jeseni v jatah obiskujejo požeta strnišča, kompostne kupe in gnojišča. Na Goričkem je pogost gnezdilec z izrazito zgostitvijo na severozahodu med Rogašovci in Sotino.	

Ščinkavec *Fringilla coelebs*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	9630 - 10180 parov
Vrsta zabeležena v:	59 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	21,4 ± 0,6 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	750000 - 1250000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	1,0
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	811
Št. prešteti parov Goričko 2012:	856
Maksimalno parov na transektih 2012:	45
Povprečno parov na transektih 2012:	14,51
Indeks popis 2012 / NOAGS:	105,6
Ščinkavec je zelo pogost gnezdilec v Sloveniji. Največ jih prebiva v gozdu, gnezdi pa tudi v parkih in sadovnjakih. Hrano, ki jo sestavljajo različna semena in drobni nevretenčarji, pobirajo na tleh. Gnezdo je skodelasto, zgrajeno iz korenin in mahov, zunaj obdano z lišaji ter mehko postlano s perjem. Jeseni se ščinkavci združujejo v velike jate, ki jih lahko opazujemo na požetih njivah, kako stikajo za razsutim in pozabljenim semenjem. Na Goričkem je pogost in splošno razširjen gnezdilec z največjimi gostotami v osrednjem in jugovzhodnem delu območja.	

Repnik *Carduelis cannabina*




Vir podatkov za grafični prikaz:	tetrade NOAGS (2003-2010), popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	150 - 200 parov
Vrsta zabeležena v:	8 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	10000 - 15000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	1,4
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	da
Status SPEC:	SPEC 2
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	25
Št. prešteti parov Goričko 2012:	12
Maksimalno parov na transektih 2012:	4
Povprečno parov na transektih 2012:	0,20
Indeks popis 2012 / NOAGS:	47,5
Repnik je gnezdilec ekstenzivno obdelane kmetijske krajine, v kateri ne sme manjkati površin v začetnih fazah zaraščanja. Gnezdi namreč v grmovju. Hrani se pretežno s semeni plevelov, regrata, osatov, navadnega plešča ipd., manjši delež pa sestavljajo nevretenčarji. Glavnino plena najde na počivajočih njivah (prahah), poraslih s pleveli, na robovih jarkov in na neškropljenih njivah, kjer rastejo kulture z oljnatimi semeni (npr. različne križnice). Na Goriškem je maloštevilen gnezdilec, predvsem nižinskih delov na vzhodu.	

Lišček *Carduelis carduelis*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	730 - 890 parov
Vrsta zabeležena v:	31 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	$1,8 \pm 0,2$ parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	28000 - 112000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	1,2
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	da
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	69
Št. prešteti parov Goričko 2012:	40
Maksimalno parov na transektih 2012:	4
Povprečno parov na transektih 2012:	0,68
Indeks popis 2012 / NOAGS:	57,9
Lišček je v Sloveniji zelo pogost gnezditelj, ki pri izbiri življenjskega okolja ni zahteven. Najdemo ga v parkih, naseljih, drevoredih, vinogradih in sadovnjakih. Gnezdo je skledaste oblike, zasidrano med drobnejše vejice. V prehrani mladičev prevladujejo drobni nevretenčarji, jeseni pa se liščki hranijo predvsem z različnimi semeni. Na peščenih površinah (dvorišča, kolovozi) pogosto nabirajo gastrolite, drobne kamenčke, ki jim pomagajo pri prebavi semen. Na Goriškem je pogost predvsem v odprti kmetijski krajini na skrajnem severozahodu.	

Zelenec *Carduelis chloris*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	3690 - 4040 parov
Vrsta zabeležena v:	52 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	8,4 ± 0,4 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	101000 - 142000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	3,2
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	190
Št. prešteti parov Goričko 2012:	222
Maksimalno parov na transektih 2012:	12
Povprečno parov na transektih 2012:	3,76
Indeks popis 2012 / NOAGS:	116,5
Zelenec gnezdi na drevju v parkih, drevoredih, sadovnjakih, mejicah in gozdnih robovih. Mladiče hrani z drobnimi nevretenčarji, jeseni pa zelenci na strniščih iščejo predvsem semena. V tem času oblikujejo velike, lahko tudi mešane jate z drugimi vrstami, na primer ščinkavci, pinožami in strnadi. Na Goriškem je precej pogost, zlasti na njegovem skrajnem severozahodnem delu med Rogašovci in Sotino.	

Grilček *Serinus serinus*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	1180 - 1380 parov
Vrsta zabeležena v:	32 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	2,8 ± 0,2 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	65000 - 115000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	1,4
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	da
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	78
Št. prešteti parov Goričko 2012:	75
Maksimalno parov na transektih 2012:	8
Povprečno parov na transektih 2012:	1,27
Indeks popis 2012 / NOAGS:	96,7
Grilčki se iz prezimovališč vrnejo konec marca ali v začetku aprila. Prebivajo v parkih, drevoredih, visokodebelnih sadovnjakih in naseljih z obilico drevja. Gnezdo je skledasto, nameščeno na drevesu. Grilčki se hranijo z drobnimi nevretenčarji in različnimi semeni. Na Goričkem je grilček pogost gnezdilec, ki največje gostote dosega predvsem na zahodu in jugu območja.	

Dlesk *Coccothraustes coccothraustes*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	2000 - 3000 parov
Vrsta zabeležena v:	43 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	9,0 ± 0,4 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	25000 - 35000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	8,3
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	32
Št. prešteti parov Goričko 2012:	128
Maksimalno parov na transektih 2012:	15
Povprečno parov na transektih 2012:	2,17
Indeks popis 2012 / NOAGS:	399,6
Dlesk je gnezdilec listnatih in mešanih gozdov. Med vsemi v Sloveniji živečimi predstavniki družine ščinkavcev ima najmočnejši kljun, s katerim lahko brez težav stre tudi češnjevo koščico. Jeseni se rad druži v jate, ki obiskujejo drevesa belega gabra in se hranijo z njegovimi plodovi. Na Goriškem je dokaj pogost gnezdilec, z večjimi gostotami v obsežnih gozdovih okoli Bukovniškega jezera.	

Krivokljun *Loxia curvirostra*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G?
Ocena populacije v KPG:	0 - 5 parov
Vrsta zabeležena v:	1 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	8000 - 13000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	0,0
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	-
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	0
Št. prešteti parov Goričko 2012:	2
Maksimalno parov na transektih 2012:	2
Povprečno parov na transektih 2012:	0,03
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Krivokljun je med pevci posebnejši glede obdobja gnezditve. Praviloma namreč gnezdi pozimi, ko dozorijo storži iglavcev. Njegov kljun po obliki spominja na papagajevega, vendar sta spodnji in zgornji del prekrizana. Z njim preščipne luske storžev in tako izlušči mastno, hranljivo seme. Najpogostejši je v gorskih iglastih gozdovih, na Goričkem pa morda gnezdi v gozdovih rdečega bora, vendar v letih naših popisov nikakor ni bil številen.	

Rumeni strnad *Emberiza citrinella*




Vir podatkov za grafični prikaz:	popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	3000 - 5000 parov
Vrsta zabeležena v:	56 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	15,8 ± 0,5 parov na km ²
Ocena populacije v Sloveniji:	90000 - 115000 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	3,9
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	da
Status SPEC:	Non-SPEC ^E
Rdeči seznam:	V
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	366
Št. prešteti parov Goričko 2012:	399
Maksimalno parov na transektih 2012:	19
Povprečno parov na transektih 2012:	6,76
Indeks popis 2012 / NOAGS:	109,1
Rumeni strnad naseljuje ekstenzivno obdelano mozaično krajino s postopno košenimi travniki, manjšimi njivami, peščenimi kolovozi, posameznimi drevesi in skupinami grmovja, pri dnu katerih gnezdi. Njegovo pesem lahko opišemo kot otožno ponavljanje napeva »si-si-si moj«. V zimskem času rad obišče kupe gnoja, v katerih brska za semenjem. Ene izmed najvišjih gostot v Sloveniji dosega ta vrsta ravno na vzhodnem Goričkem.	

Trstni strnad *Emberiza schoeniclus*



Vir podatkov za grafični prikaz:	redke vrste NOAGS (2010)
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	1 – 3 pari
Vrsta zabeležena v:	0 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	100 – 200 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	1,3
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	ne
Status SPEC:	Non-SPEC
Rdeči seznam:	V
Rdeči seznam (osnutek):	LC
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	
Št. prešteti parov Goričko 2012:	-
Maksimalno parov na transektih 2012:	-
Povprečno parov na transektih 2012:	-
Indeks popis 2012 / NOAGS:	-
Trstni strnad prebiva v različnih tipih mokrišč, najbolj pa mu ustrezajo trstišča. Ponekod po zahodni Evropi gnezdi tudi na njivskih površinah (Brickle & Peach 2004). Gnezdo je skrito v rastlinju pri tleh. Hrani se z nevretenčarji (gosenicami in pajki) ter z zrnjem, ki ga lahko nabira tudi na njivah. Na Goričkem je zelo redek gnezdilec, ki je bil zabeležen le v trstiščih Ledavskega jezera.	

Veliki strnad *Emberiza calandra*



Vir podatkov za grafični prikaz:	tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste NOAGS (2003-2012), SIPKK, popis 2012
Gnezditveni status:	G
Ocena populacije v KPG:	30 - 70 parov
Vrsta zabeležena v:	6 od 59 transektov
Relativna gnezditvena gostota v KPG:	-
Ocena populacije v Sloveniji:	4900 - 10500 parov
% parov v KPG glede na Slovenijo:	0,6
Indikatorska vrsta kmetijske krajine:	da
Status SPEC:	SPEC 2
Rdeči seznam:	V
Rdeči seznam (osnutek):	NT
Dodatek Direktive o pticah:	-
Št. prešteti parov NOAGS (2003-2010):	19
Št. prešteti parov Goričko 2012:	12
Maksimalno parov na transektih 2012:	6
Povprečno parov na transektih 2012:	0,20
Indeks popis 2012 / NOAGS:	64,7
Veliki strnad je ptica nižinske kmetijske krajine. Potrebuje mozaik ekstenzivnih travnikov, manjših žitnih njiv in posameznih grmičkov ali dreves, na katerih samci pojejo. Njegova pesem spominja na zvončkljanje s šopom ključev. Gnezdo je na tleh in skrito pod šop trave ali grm. V gnezditvenem času se prehranjuje zlasti z majhnimi nevretenčarji, kasneje pa postanejo zelo pomembna različna semena. Zaradi intenzifikacije kmetijstva je populacija velikega strnada po Evropi in tudi na	

Goričkem upadla. Na Goričkem je maloštevilen gnezdilec vzhodnega dela, kjer prebiva zlasti na ravnini.

Aleš, K. (2005): Populacijska dinamika in gnezditvena biologija pribe *Vanellus vanellus* na Ljubljanskem barju. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo.

Bauer, H.-G., E. Bezzel, W. Fiedler & S. Baumann (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas. 3 Bände: Alles über Biologie, Gefährdung und Schutz. Aula-Verlag, Wiebelsheim.

Bedič, E. (2003): Zlatovranka *Coracias garrulus*. *Acrocephalus* 24 (119): 151.

Bibby, C. J., N. D. Burgess & D. A. Hill (1992): Bird Census Techniques. Academic Press, London.

Božič, L. (2000): Bičja trstnica *Acrocephalus schoenobaenus*. *Acrocephalus* 21 (102-103): 283.

Božič, L. (2005): Gnezditvena razširjenost in velikost populacije kosca *Crex crex* v Sloveniji leta 2004. *Acrocephalus* 26 (127): 171-179.

Bračko, F. (2007): Velika uharica *Bubo bubo*. *Acrocephalus* 28 (134): 129-130.

Brickle, N.W. & W.J. Peach (2004): The breeding ecology of Reed Buntings *Emberiza schoeniclus* in farmland and wetland habitats in lowland England. *Ibis* 146 (Suppl. s2): 69-77.

Denac, D. (2000): Goričko. Str. 173-182. V: Polak, S. (ur.): Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji. Important Bird Areas (IBA) in Slovenia. DOPPS, Monografija DOPPS št. 1, Ljubljana.

Denac, D. (2001): Gnezditvena biologija, fenologija in razširjenost bele štokrlje *Ciconia ciconia* v Sloveniji. *Acrocephalus* 22 (106-107): 89-103.

Denac, D. (2002): Škorec *Sturnus vulgaris*. *Acrocephalus* 23 (113-114): 152-153.

Denac, D. (2010): Population dynamics of the White stork *Ciconia ciconia* in Slovenia between 1999 and 2010. *Acrocephalus* 31 (145-146): 101-114.

Denac, K., L. Božič, B. Rubinič, D. Denac, T. Mihelič, P. Kmecl & D. Bordjan (2010): Monitoring populacij izbranih vrst ptic. Popisi gnezdk in spremljanje preleta ujed spomladi 2010. Delno poročilo. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor. DOPPS, Ljubljana.

Geister, I. (1995): Ornitološki atlas Slovenije. Državna založba Slovenije, Ljubljana. 287 str.

Gjergjek, R. (2013): Zlatovranke se vračajo na Goričko. *Svet ptic* 19 (3): 37-39.

Janžekovič, F. & M. Ficko (2000): Prehrana pegaste sove *Tyto alba* na Goričkem. *Acrocephalus* 21 (98-99): 27-29.

Järvinen, O. & R. A. Väisänen (1975): Estimating relative densities of breeding birds by the line transect method. *Oikos* 26: 316-322.

Järvinen, O. & R. A. Väisänen (1983): Confidence limits for estimates of population density in line transects. *Ornis Scandinavica* 14: 129–134.

Jenness, J. (2005): Random Point Generator 1.3. - http://www.jennessent.com/arcview/random_points.htm

Kmecl, P. & Figelj, J. (2013): Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine - poročilo za leto 2013. DOPPS, Ljubljana.

Kmecl, P., Jančar, T. & Mihelič, T. (*v pripravi*): Dramatičen upad števila travniških ptic ter velik upad števila ptic kmetijske in gozdne krajine v Kozjanskem parku med leti 1999 in 2010.

Kosi, F. (2000): Velika uharica *Bubo bubo*. *Acrocephalus* 21 (98-99): 88.

Mihelič, T. (2002): Novi ornitološki atlas Slovenije. Navodila za popisovalce. DOPPS, Ljubljana.

Odum, E.P. (1971): Fundamentals of ecology. W.B. Saunders, Philadelphia, 574 str.

Samwald, F. & O Samwald (1992): Brutverbreitung und Bestandentwicklung der Zwergohreule (*Otus scops*) in der Steiermark. *Egretta* 35: 37-48.

Shannon, C. E. (1948): A mathematical theory of communication. *The Bell System Technical Journal* 27: 379-423 in 623-656.

Štumberger, B. (2000): Veliki skovik *Otus scops* na Goričkem. *Acrocephalus* 21 (98-99): 23- 29.

Štumberger, B. (2003a): Rdečenogi martinec *Tringa totanus*. *Acrocephalus* 24 (116): 33.

Štumberger, B. (2003b): Kavka *Corvus monedula*. *Acrocephalus* 24 (117): 78.

Tome, D. (2000): Winter diet of the Long-eared Owl *Asio otus* in Slovenia. *Acrocephalus* 21 (98-99): 3-7.

Tome, D. (2009): Changes in the diet of Long-eared Owl *Asio otus*: seasonal patterns of dependence on vole abundance. *Ardeola* 56 (1): 49-56.

Uradni list RS (2002): Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam. Ur. l. RS, 82/2002.

Vrezec, A. (2004a): Čapljica *Ixobrychus minutus*. *Acrocephalus* 25 (121): 93.

Vrezec, A. (2004b): Rečni cvrčalec *Locustella fluviatilis*. *Acrocephalus* 25 (121): 96.